

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

外用鎮痛消炎薬

【販売名】

エプーリFEゲル2

第2類医薬品

■特徴

- エプーリFEゲル2は、痛みやはれのもとに直接作用するフェルビナク3.0%配合した非ステロイド系の鎮痛消炎薬です。
- フェルビナクは、患部で痛みや腫れに関係する物質（プロスタグランジン）の生成を抑え、肩・腰・関節・筋肉の痛みにすぐれた効き目をあらわします。
- サッパリとしてベタつきのないのびのよい無色透明のゲルです。
- メントール3.0%配合により、塗布後心地よい清涼感があります。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないで下さい。

- (1)本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)ぜんそくを起こしたことがある人。
- (3)妊婦又は妊娠していると思われる人。(4)15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないで下さい。

- (1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口又は化膿している患部。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。*

症状の名称	症 状
ショック* (アナフィラキシー)*	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。*

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師、又は登録販売者にご相談下さい。

【効能・効果】

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、打撲、捻挫、腱鞘炎（手・手首・足首の痛みと腫れ）、肘の痛み（テニス肘など）

【用法・用量】

1日2～4回、適量を患部に塗擦して下さい。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)定められた用法を守って下さい。
- (2)目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けて下さい。
- (3)外用にのみ使用して下さい。
- (4)薬剤塗布後、患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないで下さい。

【成分・分量】（100g中）

成分	分量	はたらき
フェルピナク	3.0g	炎症を抑え、痛みやはれを鎮めます
1-メントール	3.0g	清涼感を与え、痛みをやわらげます

添加物として、エタノール、エデト酸Na、ジイソプロパノールアミン、プロピレングリコール、アジピン酸ジイソプロピル、カルボキシビニルポリマー、ヒプロメロースを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない所に密栓して保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。）
- (4)本剤を火気に近づけないで下さい。また、使用後は火中に投じないで下さい。
- (5)使用期限が過ぎた製品は使用しないで下さい。また、開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用して下さい。

〔内容量〕

50g

*本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。
株式会社 近江兄弟社
TEL：0748-32-3135 受付時間：9：00～17：30（土、日、祝日を除く）

発売元 **オールジャパンドラッグ株式会社**

企画・開発 **株式会社 近江兄弟社**

滋賀県近江八幡市魚屋町元29

製造販売元 **万協製薬株式会社**

三重県多気郡多気町五柱1169-142