

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

〈外皮用薬〉 エプールHPクリーム

非ステロイド
非尿素

第2類医薬品

ヘパリン類似物質の3つの効果

1. 血行促進作用

血流の循環を良くして、皮膚の新陳代謝を促進します。

2. 抗炎症作用

荒れた皮膚の症状を鎮めて、皮膚自身の持つ正常化機能を回復させます。

3. 保湿作用

乾燥皮膚の角質層内の水分量を増加させます。



使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。

出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病など)の人

2. 次の部位には使用しないでください。

目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣など)



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

(1)医師の治療を受けている人。

(2)本人または家族がアレルギー体質の人。

(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(4)湿潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

裏面もお読みください。

【効能・効果】

きず・やけどのあとの皮ふのしこり・つっぱり（顔面を除く）、手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮ふ、しもやけ（ただれを除く）、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

【用法・用量】

1日1～数回、適量を患部にすりこむか、またはガーゼなどにのばして貼ってください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)本剤は外用にのみ使用してください。
※出血のある傷口には使用しないでください。（血が止まりにくくなる場合があります。）
※顔面にある傷あと、やけどのあとには使用しないでください。

【成分・分量】 100g中に次の成分を含みます。

成分	分量	はたらき
ヘパリン類似物質	0.3g	血行促進作用、抗炎症作用、水分保持作用があります。

添加物としてセタノール、ステアリルアルコール、ポリソルベート60、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、グリセリン、プロピレングリコール、パラベン、エデト酸ナトリウム水和物、ワセリン、流動パラフィン、ジメチルポリシロキサン、ミリスチン酸イソプロピル、カルボキシビニルポリマー、自己乳化型モノステアリン酸グリセリン、スクワラン、トリエタノールアミンを含有します。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1)高温・直射日光をさけ、涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- (4)使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。（品質保持のため）

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願いいたします。
万協製薬株式会社
電話 0598-37-2088 受付時間 AM10:00～PM5:00（ただし、土、日、祝祭日は除きます。）

発売元
株式会社プロダクト・イノベーション
富山県富山市浜黒崎 239 番地

製造販売元
万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂 1169-142