

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

モンルナPVAローション

第2類医薬品

鎮痒消炎薬

8つの有効成分を配合

アンテドラッグステロイド	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル
抗炎症成分	グリチルレチン酸
かゆみ止め成分	ジフェンヒドラミン塩酸塩、クロタミトン、リドカイン
血行促進成分	トコフェロール酢酸エステル
殺菌成分	イソプロピルメチルフェノール
組織修復成分	アラントイン



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の部位には使用しないでください。

- (1)水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部
- (2)目や目の周囲、粘膜等

2. 顔面には、広範囲に使用しないでください。

3. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4)患部が広範囲の人。
- (5)湿潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚 (患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

湿疹、皮膚炎、かゆみ、かぶれ、あせも、じんましん、虫さされ

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗擦してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)外用にのみ使用してください。

【成分・分量】 100g中に次の成分を含みます。

成 分	分量	は た ら き
ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル (アンテドラッグステロイド剤 PVA)	0.15g	高い消炎作用により、湿疹・皮膚炎等の炎症をしずめます。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2.0g	抗ヒスタミン作用により、かゆみの発生を抑えます。
クロタミトン	5.0g	患部のかゆみを抑えます。
トコフェロール酢酸エステル	1.0g	血行を促進し、治療を助けます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌効果により、患部の感染を防ぎます。
グリチルレチン酸	0.5g	患部の炎症を抑えます。
アラントイン	0.2g	傷の治りを助け、組織を修復します。
リドカイン	2.0g	局所麻酔作用により痛み、かゆみを抑えます。

添加物として、流動パラフィン、ワセリン、ジメチルポリシロキサン、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ヒドロキシエチルセルロース、エデト酸Na、パラベン、リン酸、ジブチルヒドロキシトルエンを含有します。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願いいたします。
万協製薬株式会社 電話 0598-37-2088
受付時間 AM10:00～PM5:00(ただし、土、日、祝祭日は除きます。)

発 売 元 **日邦薬品工業株式会社**

東京都渋谷区代々木3-46-16
<http://www.nippo-yakuhin.jp/>

製造販売元 **万協製薬株式会社**

三重県多気郡多気町五桂1169-142