

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

鎮痒消炎薬

虫さされ・かゆみに

エプールα液

第Ⅱ類医薬品

皮膚の炎症をおさえるデキサメタゾン酢酸エステルに、かゆみをおさえるジフェンヒドラミン塩酸塩、患部に清涼感をもたらす α -メントール、 $d\alpha$ -カンフル、殺菌作用のあるイソプロピルメチルフェノールを配合しています。

本剤は、アルコール類を基剤とする透明の液体で、患部に軽く塗布するだけで爽快感を与える、皮膚へのなじみもよく、速やかに乾燥し、べつつかず衣類をよごしません。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の部位には使用しないでください。
 - 水痘(水ぼうそう)、みずむし、たむし等又は化膿している患部。
 - 創傷面、目の周囲、粘膜等。
- 顔面には、広範囲に使用しないでください。
- 長期連用しないでください。



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊娠又は妊娠していると思われる人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 患部が広範囲の人。
 - 湿潤やただれのひどい人。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白斑、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

- 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布してください。

(用法及び用量に関する注意)

- (1)キャップをとりはずし、スポンジ部分を肌に1~2回軽く押し当てて、スポンジに薬液をしみ込ませてからご使用ください。
- (2)定められた用法・用量を守ってください。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (5)外用にのみ使用してください。

【成分・分量】 100mL中に次の成分を含みます。

成 分	分 量	効 き
デキサメタゾン酢酸エステル	25mg	ぶりかえすかゆみやはれ、赤み等のもととなる炎症を抑えます。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	1.0g	抗ヒスタミン作用により、かゆみの発生を抑えます。
β-メントール	3.0g	清涼感を与え、かゆみをしずめます。
dβ-カンフル	2.0g	
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌効果があります。

添加物として、ジブチルヒドロキシトルエン、ラウロマクロゴール、エタノールを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光をさけ、涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)火気に近づけないでください。
- (5)メガネ、時計、アクセサリー、プラスチック類、化繊製品、皮革製品、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- (6)使用期限(外箱及び容器に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。
- (7)使用後は必ずキャップを十分にしめてください。

本品についてお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡ください。

新新薬品工業株式会社 CHC事業部 お客様相談室

〒930-2221 富山県富山市今市324番地

電話番号 076-435-0878

(土、日、祝日を除く 9:00~17:00)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

販売元 新新薬品工業株式会社
富山県富山市今市324番地

製 造 販売元 万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142