

省資源化のため箱が説明書を兼ねています。
ご使用に際して、この箱の説明を必ず読んでください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

販売名 ラホヤPVA8クリーム

第②類医薬品

〈皮膚疾患治療薬〉

△ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください

(1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。

(2) 目の周囲、粘膜等。

2. 顔面には、広範囲に使用しないでください

3. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(4) 患部が広範囲の人。

(5) 湿潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん

用法・用量 1日数回、適量を患部に塗擦してください。

用法・用量に関連する注意

(1) 定められた用法・用量を守ってください。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4) 外用にのみ使用してください。

成分・分量

(1g中) プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル(PVA) 1.5mg、グリチルレチン酸 5mg、ジフェンヒドラミン塩酸塩 20mg、クロタミトン 50mg、リドカイン 20mg、トコフェロール酢酸エステル 10mg、アラントイン 2mg、イソプロピルメチルフェノール 1mg、添加物として、セトステアリルアルコール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、モノステアリン酸グリセリン、プロピレングリコール、ヒドロキシエチルセルロース、エデト酸Na、パラベン、リン酸、水酸化ナトリウム、ジブチルヒドロキシルエンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わります。)。 (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

お問い合わせ先
万協製薬株式会社 お客様相談室
電話 0598-30-5376
受付時間 10:00～17:00
(ただし、土、日、祝日は除きます。)

製造販売元

万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五桂1169-142