

省資源化のため、箱が説明書を兼ねています。ご使用に際して、この箱の説明を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

販売名：ヒフルN点鼻薬
（鼻炎用点鼻薬）**第2類医薬品**

【功能・効果】

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎または副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：鼻づまり、鼻みず、くしゃみ、頭重

【用法・用量】

成人（15歳以上）及び7歳以上の小兒：1回に1～2滴ずつ、1日1～5回、鼻腔内に噴霧してください。なお、適用間隔は3時間以上おいてください。

【用法・用量に関連する注意】

- (1)過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがあります。
- (2)小兒に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)点鼻用にのみ使用してください。

【成分・量】（100mL中）

ナファゾリニン塩酸塩…0.05g、クロルフェニラミンマレイン酸塩…0.5g、リドカイン…0.5g、グリチルリチン酸二カリウム…0.3g、ベンザルコニウム塩化物…0.02g、添加物として、グリセリン、pH調節剤を含有します。

製造販売元
万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142

万協製薬株式会社
「お客様相談室」
電話番号 0598-30-5376
受付時間 10:00～17:00
（ただし、日、祝日は除きます）

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
☎ 0120-149-931

内容量 30mL

▲ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります

1. 次の人は使用しないでください
本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 長期連用しないでください

☒ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 四次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、線内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位 症状

皮膚	発疹・発赤・かゆみ
鼻	はれ、刺激感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

**症状の
名前 ショック
(アナフィラキシー)**

症状 使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、どののかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 3日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

花粉・ハウスダストなどによる


**鼻みず
鼻づまり
くしゃみに**

**アレルギー性鼻炎薬
ヒフルN
点鼻薬**




【保管及び取扱上の注意】

1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります）
4. 他の人と共用しないでください。
5. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、なるべく速やかに使用してください。



（使用方法）

1. キャップをはずします。
2. 初めてご使用の際は、液が漏れる場合は1部数回、空射して下さい。
3. 右のようく容器を持ち、ノズルを鼻腔内に少し差し入れます。
4. 静かに息を吸い込みながら、ねばを下まで押して1回(1度)ずつ噴霧してください。
*できるだけ垂直に近い角度でお使いください。
5. 使用後は清潔なティッシュペーパーやガーゼなどをノズルを拭きキャップをして保管してください。



4 535653 001273
セルフメディケーション
税控除対象

