

対策製薬
発毛促進剤

カミングアウト
COMING OUT

第2類医薬品

対策製薬
発毛促進剤

カミングアウト
COMING OUT

カルプロニウム
塩化物 1%
+

6つの
有効成分が
発毛を促進!

第2類医薬品

30mL

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) イヤホン、補聴器、メガネ、アクセサリ類、時計、寝具、家具、床、化学繊維、皮製品、プラスチック類等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- (5) 染毛料等を使用している場合は、本剤の使用により、衣類や枕カバー等への色移りが起こることがあるので注意してください。
- (6) 火気に近づけないでください。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、なるべく速やかに使用してください。

製造販売元

万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五柱 1169-142

発売元
大成株式会社
大阪府大阪市浪速区桜川 4 丁目 3-2 2
For You 桜川ビル 5 階

万協製薬株式会社「お客様相談室」
電話 0598-30-5376
受付時間 10:00~17:00
(ただし、土、日、祝日は除きます。)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

MADE IN JAPAN



82411

M004



上段は使用期限、
下段は製造番号です

開封口

【効能・効果】

発毛促進、育毛、脱毛(抜毛)の予防、若禿(壮年性脱毛症)、薄毛、ふけ、かゆみ、病後・産後の脱毛、乾癬性脱毛症、円形脱毛症

【用法・用量】

1日2~3回適量を頭皮・頭髮にふりかけ、マッサージしてください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守し、過量に使用しないでください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 薬液のついた手で目などの粘膜に触れると刺激がありますので、手についた薬液はよく洗い落としてください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5) 洗髪後の使用は効果的ですが、湯あがり直後は発汗等の副作用があらわれる傾向があるので、ほてりをさましてから使用してください。
- (6) 本剤は頭皮にのみ使用してください。

【成分・分量】(100mL中)

カルプロニウム塩化物…………… 1.0g
バンドニールエチルエーテル…………… 1.0g
ジヒドキシム塩酸塩…………… 0.05g
ジェンヒドラミン塩酸塩…………… 0.1g
サリチル酸…………… 0.2g
1-メントール…………… 0.3g
添加物：エト酸ナトリウム水和物、d-1-ヒロリドンカルボン酸ナトリウム液、L-1-酒石酸ナトリウム水和物、エタノール

省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。ご使用に際して、この箱の記載内容必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

【販売名】カミングアウト

【内容量】30mL

発毛促進剤

第2類医薬品

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください。
 - (1) 傷、湿疹あるいは炎症(発赤)等のある頭皮
 - (2) 頭皮以外

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 薬や化粧品等によりアレルギー症状を起したことがある人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、水又はぬるま湯で洗い流して、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
頭皮	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ
その他	全身性の発汗、それに伴う寒気、顔のほてり、ふるえ、吐き気、頭痛

3. 使用後、次の症状の持続又は増強が見られた場合には使用を中止し、水又はぬるま湯で洗い流して、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
頭皮	刺激痛、局所発汗、熱感
手(指先)	手荒れ

1