

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

指定医薬部外品

ラップ絆A

【特 長】

1. 「すり傷」、「切り傷」、「さし傷」、「靴ずれ」にさっと手当できます。
2. うすい被膜がバイ菌、ホコリなどの侵入を防ぎ、水に濡れてもしみません。
3. 透明タイプで目立ちにくくなっています。

【こんな時に…】

- ・炊事、洗濯で傷口がしみる時に ・水仕事、園芸等に ・海水浴やプール、釣りなどでの傷の保護に ・スポーツやアウトドアのちょっとしたケガに
- ・靴ずれなどに



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください。
 - (1)ただれ、化膿している患部、出血している患部、傷口の大きい患部
 - (2)目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣など)
 - (3)顔面、頭部
 - (4)ヒゲそり、除毛、脱毛等により傷んだ皮膚



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1)医師の治療を受けている人
 - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

【効能・効果】

すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の消毒・保護(被覆)

【用法・用量】

最初にご使用になる時は、キャップを逆さにしてチューブの口に強く押し込んで穴をあけてください。

傷面の水分や付着物をよくふきとり、適量を患部に塗布し乾燥させてください。

（用法・用量に関連する注意）

- (1)患部やその周辺が汚れたまま使用しないでください。
- (2)患部が汗や水でぬれている場合は水分をよく拭き取ってから使用してください。
- (3)目に入らないように注意してください。
万一、目に入った場合は、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (4)外用にのみ使用し絶対に内服しないでください。
- (5)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとで使用してください。
- (6)傷口以外に広く塗らないでください。
- (7)傷に塗った時、一瞬しみますが乾燥するとしみなくなります。
- (8)固まった皮膜を無理にはがそうすると、皮膚を傷つけてしまう可能性がありますのでご注意ください。
※急いではがしたい時は、本品を上塗りし、乾かないうちに拭き取ってください。

●チューブの折り(尾)の部分から先端に向けて順に押し出してください。(①→②)



●チューブが破れて薬剤がとび出るおそれがあります。
折り曲げないでください。 折りたたまないでください。



【成分・分量】

100 g 中に次の成分を含みます。

トリクロロカルバニリド……0.1 g

添加物としてピロキシリン、dl-カンフル、ヒマシ油、ミリスチン酸イソプロピル、酢酸エチル、エタノールを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
(密栓しないと薬剤が固まる恐れがあります)
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)火気に近づけないでください。
- (5)誤飲(指をしゃぶるなど)のおそれがある場合は使用を避けてください。
- (6)外箱に表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (7)衣類、家具、床等につくと非常に取れにくいので、つかないように注意してください。

本品についてのお問い合わせは
お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

万協製薬株式会社「お客様相談室」

電話 0598-30-5376

受付時間 10:00～17:00

(ただし、土、日、祝日は除きます。)

製造販売元

万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五桂1169-142