

注意－人体に使用しないこと



【使用上の注意】



【してはいけないこと】

(守らないと副作用・事故が起こりやすくなる)

- 1.居室(客室、事務室、教室、病室を含む)では使用しないこと。
なお、居室にある戸棚・キャビネット内などでも使用しないこと。
- 2.飲食する場所(食堂など)及び飲食物が露出している場所(調理場、食品倉庫、食品加工工場など)では使用しないこと。



【相触すること】

- 1.万一、身体に異常が起きた場合は、使用を中止し、この文書を持って本剤が有機リン系の殺虫剤であることを医師に告げて診療を受けること。
本剤の解毒剤としては、硫酸アトロピン製剤及びPAM製剤(2-ピリジンアルドキシムメチオダイド製剤)が有効であると

報告されている。

- 2.今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人は、使用前に医師又は薬剤師に相談すること。
- 3.表面に少量の液体が付着することがあるので、目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、この文書を持って眼科医の診療を受けること。

【その他の注意】

- 1.定められた用法及び用量を厳守すること。
- 2.小児や家畜動物のとどこない範囲で使用するこ。
- 3.愛玩動物(小鳥、魚等)の直ぐそばに吊るすことは避けること。
- 4.有害であるから飲食物、食器、小児のおもちゃ又は飼料等に直接触れないようにすること。
- 5.本剤を多量に又は頻りに取り扱う場合は、ゴム手袋を着用すること。
- 6.本剤を取り扱った後又は皮膚に触れた場合は、石けんと水でよく洗うこと。
- 7.使用前に開封し、有効期間そのまま吊り下げておくこと。

8.一度開封したら必ず使用するようにすること。

【保管及び取扱い上の注意】

保管する場合は、直射日光を避け、小児や家畜動物のとどこない冷暗所に保管すること。


【廃棄の方法】

- 1.不用品になった包装はプラスチックごみとして市区町村の処理基準に従って適正に捨てること。
- 2.開封した本剤の有効期間は通常2～3箇月である。有効期間が過ぎ、効力がなくなったらプラスチックごみとして市区町村の処理基準に従って適正に捨てること。

発売元 日曹商事株式会社
東京都中央区日本橋本町3丁目3番6号
電話 (03) 3270-4816
製造販売元 株式会社バイロン
群馬県高崎市大八木町888番地

有効期間

浄化槽・下水槽
の害虫退治には



蒸散性殺虫剤 第1類医薬品

日曹殺7-レトP-H

業務用



- 使用上の注意をよく読む。
- 記載以外には使用しない。
- 蒸散性殺虫剤には使用しない下さい。

本剤は有害性につき
取扱いに十分注意する。



保護手袋着用

保護マスク着用



子供注意

保護メガネ着用

蒸散性殺虫剤 第1類医薬品

日曹殺7-レトP-H

■成分及び分量

有効成分：1枚(57.5g)中ジクロロロス………10.695g
その他成分：塩化ビニル樹脂、その他9成分

■製品の特徴

- ①使い方が簡単です。袋から出して天井や壁面から吊り下げて下さい。
- ②効き目は2～3箇月持続します。殺虫成分が少しずつ連続して蒸散します。一度吊るせばあとから侵入する害虫も防ぎます。
- ③隠れた場所の害虫にも効果があります。蒸散した殺虫成分がわずかなすきまで行きわたり、隠れている害虫にも効き目をあらわします。

■用法及び用量

1.本剤は、開封したのち下記の要領に従い使用すること。

使用場所	対象害虫	使用量	使用法
以下の場所のうち、人が長時間留まらない区域：店舗、ホテル、旅館、工場、倉庫、畜舎、テント、地下室	ハエ、蚊	12.5～15㎡の空間 容積当り1枚	天井又は壁から吊り下げる。
便所		4～6㎡の空間 容積当り1枚	
下水槽、 浄化槽など			蓋、マンホールから(少なくとも水面より20cm以上の高さ)に吊り下げる。
ごみ箱、 厨芥箱など	ハエ、 ゴキブリ	2.5～5㎡の空間 容積当り1枚	上蓋の中央部から吊り下げるが、又は上蓋の内側に取り付ける。
戸棚、キャビネットなど	ゴキブリ		容器の上側から吊り下げる。

- 2.同一場所に2枚以上使用する場合は、それぞれ少なくとも1.5m以上の間隔で吊ること。
- 3.開封した本剤の有効期間は通常2～3箇月である。

- 4.使用中に殺虫効果が低下したと思われるた、本剤の表面に付着したゴミ又は水分などを紙や布でふきとると再び効果が高まる。

■効能又は効果

ハエ、蚊及びゴキブリの駆除

外袋：PE、PET
ネット：PE