

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

プラセンタ製剤

第2類医薬品

新ビタエックス 錠剤

新ビタエックス錠剤は、胎盤を化学的に処理してえられる加水分解物と、乾燥させた微粉末の混合物にビタミンB1類（チアミンジスルフィド）を加えた製剤であります。豊富な蛋白質と吸収され易い各種アミノ酸、それにビタミンB1類を含んでおり、滋養強壮、肉体疲労時の栄養補給などにすぐれた効果をあらわします。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|--------|
| 皮 膚 | かゆみ、発疹 |
| そ の 他 | 生理異常 |

2. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔効 能〕

15才以上 滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給。

5才～14才 滋養強壮、虚弱体質、病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給、偏食児・幼小児の発育期などの栄養補給。

〔用法・用量〕

| 年令 | 15才以上 | 11才以上15才未満 | 5才以上11才未満 | 5才未満 |
|------|--------|------------|-----------|---------------------|
| 1回量 | 4錠 | 3錠 | 2錠 | 服用せ ないこ と |
| 服用回数 | 1日3回 | | | |

裏面もお読みください

〔用法・用量に関する注意〕

- (1)定められた用法・用量を守ってください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)本剤は5才未満の乳幼児に服用させないでください。

〔PTP包装の場合の錠剤のとり出し方〕



突き出た透明な部分を指先でアルミ箔の方へ押すと、アルミ箔が破れて錠剤が出てきます。

誤って、そのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突き刺さる等、思わぬ事故につながります。

〔成分・分量〕

本品12錠（1日量）中
胎盤加水分解物 0.54mL
胎盤乾燥微粉末 750mg
チアミンジスルフィド 18mg
添加物としてメントール、パニリン、乳糖、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、ステアリン酸Mgを含む。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)箱に「開封年月日」を記入してください。
添付文書は、箱に入れたまま保管してください。
- (5)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

日々の健康は薬だけではなく、日々の養生が大切な要因となります。
規則正しい生活を守るようにしてください。

お問い合わせ先

ビタエックス薬品工業株式会社 お客様相談室

電 話：075(691)1671(代表)

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

発 売 元 森田薬品工業株式会社

製造販売元 ビタエックス薬品工業株式会社
京都市伏見区竹田向代町7番地