

第2類医薬品

販売名

葛根湯内服液W45mL×2本

この箱に記載の文書は服用前に必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう本剤とともに保管してください。

使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
 - (4) 胃腸の弱い人
 - (5) 発汗傾向の著しい人
 - (6) 高齢者
 - (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
 - (8) 次の症状のある人　むくみ、排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた人　高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこばわりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
多形紅斑	皮膚が広い範囲で赤くなる、水疱が皮膚の赤い部分にあらわれる、高熱、のどの痛み等が持続したり、急激に悪化する。

3. 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5〜6回)服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

4. 長期連用する場合には医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

＜効能・効果＞

体力中等度以上のものの次の諸症:感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

＜用法・用量＞

次の量を、朝夕、食前又は食間によく振ってから服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1本(45mL)	2回
15歳未満	服用しないこと	

※定められた用法・用量を厳守してください。

＜成分・分量＞

1日量(2本(90mL))中に次の成分及び分量を含有しています。

葛根湯エキスA……………8,300mg

日局カクコン8.0g、日局マオウ4.0g、日局タイソウ4.0g、日局ケイヒ3.0g、日局シャクヤク3.0g、日局カンゾウ2.0g、日局ショウキョウ1.0g
上記生薬より製した軟エキス

添加物として白糖、D-ソルビトール、ハチミツ、安息香酸Na、パラベン、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、香料、エタノール、バニリン、エチルバニリン、グリセリンを含有します。

＜保管及び取扱い上の注意＞

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

＜その他＞

本剤は生薬エキスを配合しているため、沈殿を生じることがありますので、よく振ってから服用してください。

＜お問い合わせ先＞

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までお願いします。

日野薬品工業株式会社 お客様相談窓口

電話0748-52-1232

受付時間9時〜17時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元

日野薬品工業株式会社

滋賀県蒲生郡日野町上野田119

A2609D

