

この箱に記載の文書は服用前に必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう本剤とともに保管してください。

販売名 葛根湯内服液H

第2類医薬品

30mL×3本

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人) (4) 胃腸の弱い人 (5) 発汗傾向の著しい人 (6) 高齢者 (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 (8) 次の症状のある人: むくみ、排尿困難 (9) 次の診断を受けた人: 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
多形紅斑	皮膚が広い範囲で赤くなる。水泡が皮膚の赤い部分にあらわれる。高熱、のどの痛み等が持続したり、急激に悪化する。

3. 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

4. 長期連用する場合には医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

体力中等度以上のももの次の諸症:感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

用法・用量

次の量を、食間によく振ってから服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上(大人)	1瓶(30mL)	3回
15歳未満	服用しないこと	

※定められた用法・用量を厳守してください。

成分・分量

1日分3本(90mL)中に、次の成分及び分量を含有しています。

葛根湯エキス-A.....8,300mg

日局 カッコン8.0g 日局 マオウ4.0g 日局 タイソウ4.0g 日局 ケイヒ3.0g 日局 シャクヤク3.0g 日局 カンゾウ2.0g 日局 ショウキョウ1.0g

上記生薬より製した軟エキス

添加物として白糖、D-ソルビトール、ハチミツ、安息香酸Na、パラベン、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、香料、エタノール、トメントール、ミツロウ、安息香酸ベンジルを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

その他

本剤は生薬エキスを配合しているため、沈殿を生じることがありますので、よく振ってから服用してください。

お問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までお願いします。
日野薬品工業株式会社 お客様相談窓口(土、日、祝日を除く)
電話:0748-52-1232 受付時間:9時~17時

製造販売元 日野薬品工業株式会社
滋賀県蒲生郡日野町上野田119

