

第2類医薬品

虚弱体質，腺病質の骨歯の発育促進

ブリル錠[®]

カルシウムは約99%が骨や歯に存在し，残りは血液中または筋肉に存在します。そして特に骨は発育期から25～30才までに造られてしまいますので若いうちに充分に骨を造り，それ以後は骨からカルシウムを流出しないように補給に注意しなければなりません。

カルシウムが不足すると骨や歯に悪影響を及ぼすばかりでなく，血液，神経，細胞，代謝などにいろいろな障害をきたします。ストレスが高まったり，イライラが高じたり，体がだるい，眠れない，食欲がないなどはカルシウムが不足しているときによく感じられる自覚症状ということになります。カルシウムは，このように体の中で非常に重要な働きをしているのです。

ブリル錠の特長

- ビタミンD₂の配合によりカルシウムの吸収を促進いたします。
- 新陳代謝機能を高め，健康維持や栄養補給に必要なビタミン(B₁，B₂，B₆)が配合されています。
- お子さまからお年寄りの方までカルシウムの補給に適しています。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること
医師の治療を受けている人。
2. 服用後，次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので，直ちに服用を中止し，この文書を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐，胃部不快感

3. 服用後，次の症状があらわれることがあるので，このような症状の持続又は増強が見られた場合には，服用を中止し，この文書を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること
便秘
4. 長期連用する場合には，医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

次の場合の骨歯の発育促進：虚弱体質，腺病質
妊娠授乳婦の骨歯の脆弱防止

用法・用量

次の服用量を1日3回服用してください。

年 齢	成人(15才以上)	8才以上15才未満	5才以上8才未満	1才以上5才未満
1回量	8～10錠	4～5錠	3錠	2錠
1才未満は服用しないこと				

(用法・用量に関する注意)

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 乳幼児に服用させる場合には、本剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。

成分・分量

30錠(1日量)中に次の成分・分量を含んでいます。

タウリン	120mg	リボフラビン(V.B ₂)	1.5mg
リン酸水素カルシウム水和物	1950mg	ビリドキシン塩酸塩(V.B ₆)	0.3mg
チアミン硝化物(V.B ₁)	3mg	エルゴカルシフェロール(V.D ₂)	300IU

添加物：白糖、乳糖、デキストリン、バレイショデンプン、トウモロコシデンプン、ステアリン酸Mg、タルク

- ・30錠中にカルシウムとして454mg含有しています。
- ・本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、リボフラビン(ビタミンB₂)によるものですから、心配ありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 本剤をぬれた手で扱わないでください。(変色したり品質が変わることがあります。)
- (5) 使用期限(外箱に記載)をすぎた製品は服用しないでください。

本品のお問い合わせは、お求めのお店又は日邦薬品工業株式会社 お客様相談室
「電話：03-3370-7174(代表)」をお願いいたします。
受付時間……………9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

発売元  **日邦薬品工業株式会社**
東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元  **福井製薬株式会社**
大阪府城東区今福東3丁目1番26号

20107131