

この説明文書は使用前に必ずお読みください
また、必要な時に読めるように保管してください

第2類医薬品

痔疾内服治療剤
新モリチーネン錠

新モリチーネン錠は、腸を整え、血行を改善し、消炎、鎮痛、止血作用のある5種の生薬からなる
乙字湯去大黃乾燥エキスを主薬にした“**のむ痔のくすり**”です。



使用上の注意

(本剤は内服痔疾用薬として定められた一般的な注意事項を記載しています)



相談すること

1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 高齢者。
- (6) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を
起こしたことがある人。
- (7) 次の症状のある人、むくみ
- (8) 次の診断を受けた人、高血圧、心臓病、腎臓病

2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って
医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症	状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ	
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振	

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症	状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱 等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。	
偽アルドステロン症 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、 徐々に強くなる。	
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振 等があらわれる。	

3.1ヵ月位(きれ痔に服用する場合には5～6日間)服用しても症状が良くならない場合は服用を中止し、この文
書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

4.長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

体力中等度又はやや虚弱なものの次の諸症：

痔核(いぼ痔)、きれ痔、軽度の脱肛

用法・用量

年 齢	成人(15才以上)	7才以上15才未満	7才未満
1 回 量	5錠	4錠	服用しないこと

1日3回、食前又は食間に水又は白湯で服用してください。

(用法・用量に関する注意)

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量 本品15錠(1日量)中

乙字湯去大黃乾燥工キス(1/2量)1,455mg

〔トウキ 2.0g, サイコ 2.0g, オウゴン 1.5g〕より抽出。
〔カンゾウ 1.0g, ショウマ 0.75g〕

添加物：薬用炭(コーティング剤)

メタケイ酸アルミン酸Mg、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖、ステアリン酸Mg、マクロゴール、ヒプロメロース、ゼラチン、アラビアゴム、白糖、青色2号、黄色5号、カルナウバロウ

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れ替えないでください。
- (4)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5)本剤は黒色の糖衣錠のため、手でふれたり湿ったりしますと艶がなくなったり白くなることがあります。

痔の養生訓

痔は、肛門部のうっ血から始まります。肛門部の血管は普通の静脈と異なり弁を持たないため、ちょっとした刺激で血液が溜まりやすく、うっ血します。

したがって ①水分を多くとる ②楽な姿勢で便通を心がける。いきみは禁物です ③いつも清潔に ④患部は温めて血行をよくする ⑤刺激物(香辛料、アルコールなど)はひかえる
これらが痔のなおりを早くいたします。

本品のお問い合わせは、お求めのお店又は下記にお願いいたします。

日邦薬品工業株式会社・お客様相談室

「電話：03-3370-7174(代表)」

受付時間・・・9：00～17：00(土、日、祝日を除く)

発売元 日邦薬品工業株式会社

東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元

福井製薬株式会社

大阪府城東区今福東3丁目1番26号