

この説明書は、使用前によくお読みください。
なお、使用が終わるまで大切に保管してください。

第②類医薬品

鎮咳去痰薬

コフチールせきどめ錠

コフチールせきどめ錠は「せき」の中樞に作用して「せき」をしずめる成分、気管支を拡張させて「せき」をしずめる成分、「たん」をうすめてはき出しやすくする成分などを配合していますので「せき」や「たん」にすぐれた効果を期待できます。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気があらわれることがあります。)
3. 授乳中の人**は**本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
4. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(6) 次の症状のある人。
高熱、むくみ、排尿困難
(7) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、腎臓病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関 係 部 位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精 神 神 経 系	めまい
そ の 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
便秘、口のかわき

【効能・効果】

せき、たん

【用法・用量】

次の1回量を1日3回毎食後服用してください。


年 齢	1 回 量
15歳以上	3錠
11歳以上15歳未満	2錠
8歳以上11歳未満	1.5錠
5歳以上8歳未満	1錠
5歳未満	服用しないでください

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。

(誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



【成分・分量と作用】

1日量（9錠）中

成 分	分量	作 用
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	せき中枢に作用してせきをしずめ、呼吸を楽にします。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	気管支をひろげて緊張をやわらげ、せきをしずめます。
グアイフェネシン	150mg	気道粘液の分泌をたかめ、たんをうすめてはき出しやすくします。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	抗ヒスタミン剤で、アレルギーが原因となって起こるせきをしずめます。
カフェイン水和物	90mg	抗ヒスタミン剤による眠気を防止します。
カンゾウ末	1000mg	気道粘液の分泌をたかめ、たんをうすめてはき出しやすくします。

添加物として、乳糖水和物、セルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、ヒドロキシプロピルスターチ、CMC-Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、ステアリン酸Mg、香料、l-メントールを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

本剤をご使用になられて、何かお気付きの点がございましたら、下記までご連絡頂きますようお願い致します。

福 地 製 薬 株 式 会 社

TEL：0748-52-2323

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）