

コフジス

うがい薬 のど

洗浄 殺菌 消毒

第3類医薬品



コップを水平にもどし
60目盛まで水を入れてください。
約60mL

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の人には使用しないでください
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

☒ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) 次の症状のある人。口内のひどいだれ。(3) 次の診断を受けた人。甲状腺機能障害

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は、副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚(ふ)	発疹、発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他の	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手のとどかない所に保管してください。(3) 誤用をさけ品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。(4) 薬液が衣類に付着した時は、すぐに水または洗剤で洗ってください。落ちにくい場合にはチオ硫酸ナトリウム(ハイポ)で洗ってください。(5) 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。(6)添付の目盛り付きコップはご使用のつど、水洗いなどして常に清潔に保管してください。

ご使用に際して、この箱の説明を必ずお読み下さい。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

使用期限

製造番号

副作用被害救済制度 電話:0120-149-931

製造販売元

福地製薬株式会社

滋賀県蒲生郡日野町寺房824
お客様相談室☎0748-52-2323
(9:00~17:00 土・日・祝日を除く)



コフジス

うがい薬 のど

洗浄 殺菌 消毒

130mL
(計量コップ付)

第3類医薬品



第3類医薬品

販売名 コフジスうがい薬

成分・分量 1mL中

ポビドンヨード 70mg
(有効ヨウ素7mg含有)

添加物として、ヨウ化K、L-メントール、D-ソルビトール液、サッカリンナトリウム水和物、グリセリン、アルコールを含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります。また、ごくまれに歯などの表面の状態により着色することがあります。

効能・効果

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

用法・用量

1回、本剤2~4mL(添付の計量コップ2~4目盛)を水約60mL(計量コップ60目盛)にうすめて、1日数回うがいてください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 用法及び用量を厳守してください。
(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。うがい液をはきだせない年齢の小児には使用させないでください。(3) うがい用にのみ使用し、内服しないでください。(4) 本剤は使用する時にのみ希釈し、うすめた液は、早めに使用してください。

(5) 使用法 うがいの仕方

キャップをあけて容器をさかさに持ち、指でゆっくり押して本剤2~4mL(添付の計量コップを斜めにして、2~4目盛)をとり、水でうすめて約60mL(計量コップを水平にもどし目盛60)にして、いねいにうがいてください。