

使用に際して、必ずこの添付文書をお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

しっしん・かぶれ・かゆみ止め

第②類医薬品

クーペαクリーム

◆**クーペαクリーム**は、湿疹、皮膚炎などの炎症にすぐれた効果を発揮します。また、不快なかゆみをおさえ、炎症によって抵抗力が弱っている皮膚への細菌感染を防ぎ、患部の治りを早めます。クーペαクリームはクリーム基剤を使用していますので、皮膚への浸透性もよく、べとつかずさっぱりとした使用感です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. **次の部位には使用しないでください。**
水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部
2. **顔面には、広範囲に使用しないでください。**
3. **長期連用しないでください。**



相談すること

1. **次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。**
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 患部が広範囲の人。
(6) 湿潤やただれのひどい人。
2. **次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。**
(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
皮膚（患部）	みずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなりません

【効能・効果】

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん

【用法・用量】

1日数回、適量を患部にすりこんでください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

【成分・分量と作用】

100g中

成 分	分 量	作 用
プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	0.15g	炎症患部でよく効き、体内で低活性に変わるアンテドラッグステロイド成分で、湿疹、皮膚炎、じんましん等の炎症をしずめます。
クロタミトン	5g	湿疹・かぶれ等に伴うかゆみをおさえます。
アラントイン	0.2g	皮膚、粘膜の新生を促し創傷面の治りを早めます。
トコフェロール酢酸エステル	0.5g	血行を促進し、治癒を促します。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌作用があります。患部の感染を防ぎ、症状の悪化を防ぎます。

添加物として、ポリオキシエチレン(20)ポリオキシプロピレン(4)セチルエーテル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、モノステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン (6E.O.)、グリセリン、ステアリルアルコール、ベヘニルアルコール、セタノール、プロピレングリコール、メチルフェニルポリシロキサン、スクワラン、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸エチル、エデト酸ナトリウム水和物

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

本剤をご使用になられて、何かお気付きの点がございましたら、下記までご連絡頂きますようお願い致します。

福 地 製 薬 株 式 会 社

T E L : 0748-52-2323

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元

福地製薬株式会社
滋賀県蒲生郡日野町寺尻824