

スキンベーププレミアム 200mL

【使用方法】●肌から約10cm離してスプレーしてください。(蚊、フユ、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエトコソラミの忌避) 適量を肌の露出面にまんべんなくスプレーする。●顔・首筋には、適量を手のひらに一度スプレーしてから肌に塗布する。(ツツガムシの忌避) 適量を肌の露出面および履物やスポンのすそ等にまんべんなくスプレーする。●顔・首筋には、適量を手のひらに一度スプレーしてから肌に塗布する。(虫刺しに関する注意) ●噴射口は顔や髪、髪・首筋等に当たらないよう注意し、顔に塗布しないようにする。●ツツガムシは見えないので、生息しているような場所にお入る前に塗布する。●濃然とした使用をさせ、蚊、フユ等が多い戸外での使用等、必要な場合にのみ使用する。

【使用上の注意】(してはいけないこと)●80秒以上連続噴射しない。●眼や口の周囲、粘膜や傷口等、肌の弱い部分には使用しない。誤ってかかった場合は、直ちに水でよく洗う。●本品はデット濃度が高いので、12歳未満の小児には使用しない。(相殺すること) ●万一服に入った場合は、すぐに大量の水またはぬるま湯をよく洗う。また、眼が赤くなる等の症状が出た場合は、直ちに本剤にエタノールティナーが含まれているので、医師に告げて診察を受ける。(その他の注意) ●定められた用法・用量を厳守する。●初めて使う人や肌の敏感な人は、上腕の内側等に少量スプレーし、その箇所に異常がないことを確かめてから使う。●万一肌に異常が現れた時は、直ちに使用を中止する。●眼に入ったり、飲んだり、なめたり、吸い込んだりすることがないようにし、塗布した手で眼をこすらない。●本品の1回使用による忌避効果の持続時間は、概ね5～8時間である。●本品を噴霧または塗布した後は、経過時間や使用時の使用者の発汗等の状況を踏まえて、適宜、本品を再度使用する。●シャツ、スポン等の衣類に噴霧する場合、繊維の種類によっては本剤により変質する場合があります。合成繊維は変質しやすいので注意する。●ストッキング等の上に直接噴射しない(生地が傷む場合があります)。●噴霧気体を直接吸入しないように注意。●同じ箇所に連続して3秒以上噴霧しないよう注意する。●食品・食器・衣類・皮革製品・毛氈・家具・塗装面・プラスチック製品等にかけないよう注意する。●マニキュア、ジェルネイル等、装飾用スチールに直接かけられないよう注意する。(保管および取り扱いの注意) ●火気や直射日光を避け、小児の手の届かない所に保管する。●缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所には置かない。●使用期限(缶底に記載)を過ぎた製品は使用しない。●頭部器具(ファンヒーター等)の周囲と高温になる場所、車内等は温度が上がり破裂する危険があるので置かない。(廃棄の方法) ●火気のない戸外で使いきったことを確認する。●ガス抜きキャップを使用し完全にガスを抜く。●使用後は地域の分別区分に従って廃棄する。●大量に残っている場合は、フマキラーお客様相談室までお問い合わせください。(ガス抜きキャップの使い方)缶を平らな地面に置き、噴射ボタン(図●部分)を両手の親指で、体重をかけてボタンが戻らない位置まで強く押し込むとボタンが固定され、ガスが抜けます。●噴射口を顔に向けない。



火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。
- ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- ③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たった所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
- ④火の中に入れないこと。
- ⑤使い切った後、火の

高圧ガス:LPガス

【販売名】

スキンベーププレミアム
【効能】蚊、フユ、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエトコソラミ、ツツガムシの忌避

【有効成分】デット30% ①

(原液濃度)

【その他の成分】エタノール、LPガス、他1成分

【内容量】200mL

火気厳禁

第一石油類 60mL

危険等級Ⅱ エタノール

【製造販売元】フマキラー株式会社

第2類医薬品

〒739-0494 広島県廿日市市梅原1-11-13

【本社所在地】〒101-8606 東京都千代田区神田美倉町11

お客様相談室 ☎0077-788-555 ☎03-3255-6400

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

【副作用救済制度】☎0120-149-931

*使用期限、製造番号は容器の底に記載。

キャップ
フィルム



使用前に必ず製品表示をよく読み、充分理解した上で使用してください。

フマキラー

医薬品

SKIN
VAPE

お肌の虫よけ
スキンベープ®

プレミアム



** さわやかミントの香り **

メントール配合

第2類医薬品