

服用に際して、必ずこの添付文書をお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

総合感冒薬

お子様にのみやすい

小児ジキナ[®]顆粒A

(非ピリン系)

◆ **小児ジキナ[®]顆粒A** は、お子様の鼻水・せき・発熱・頭痛などの様々なかぜの諸症状に、すみやかな効きめをあらわす小児用のかぜ薬です。お子様が服用しやすいように苦味を抑えたピンクの顆粒で、イチゴの味と香りが特徴です。



使用上の注意

本剤は小児用ですが、かぜ薬として一般的な注意事項を記載しています。

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬
(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。(眠気があらわれることがあります。)

4. 服用時は飲酒しないでください。

5. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (5) 次の症状のある人
 - (6) 次の診断を受けた人
- 高熱、排尿困難
心臓病、肝臓病、腎臓病、
胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	精神神経系	めまい
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振	そ の 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症 状 の 名 称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、じんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。

裏面もお読みください。

症 状 の 名 称	症 状
間質性肺炎	空せき（たんを伴わないせき）を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。（これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。）
ぜ ん そ く	

- (2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合
 3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
 □ のかわき

効 能 ・ 効 果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

用 法 ・ 用 量

次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に水またはお湯で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
7才以上11才未満	1 包	3回
3才以上7才未満	2/3包	
1才以上3才未満	1/2包	
1才未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は小児用なので、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむをえない場合にのみ服用させてください。

成 分 ・ 分 量

1日量3包（1包1,500mg）中

成 分	含 量	は た ら き
アセトアミノフェン	450mg	熱を下げ、痛みをやわらげます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	3.75mg	くしゃみ、鼻みず、鼻づまりを抑えます。
チベジジンヒベンズ酸塩	37.5mg	せき中枢の異常な興奮を抑えてせきをしずめ、気道粘膜の分泌を促進してたんを出しやすくします。
ノスカピン	24mg	せき中枢の異常な興奮を抑えてせきをすばやくしずめます。
ヘスペリジン	20mg	毛細血管を強くし、鼻みず、鼻づまりを抑えます。

添添加剤：白糖、サッカリンNa水和物、D-マンニトール、無水ケイ酸、香料、赤色106号 含有

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。）
- (4) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (5) 配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先 株式会社 富士薬品（学術室）
 電話（048）648-1118 9：00～17：30（土、日、祝日を除く）

製造販売元 **株式会社 富士薬品**
 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地