

かゆい水虫、たむしに マイルゾンTLクリーム

- ◆水虫・たむしは、皮膚の角質層内に水虫菌(白癬菌)が寄生して起こり、特有の激しいかゆみと炎症を伴う疾患です。
- ◆殺真菌成分「テルビナフィン塩酸塩」が角質層によく浸透し、水虫菌(白癬菌)を殺菌します。
- ◆かゆみ止め成分「リドカイン」が、患部のかゆみ・痛みを一時的にしのぎます。
- ◆有効成分が皮膚に留まり、1日1回の使用でよく効きます。べたつかないサラッとしたクリームでジクジクした患部にお勧めします。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。
本剤による過敏症(例えば、発疹・発赤、かゆみ、はれなど)を起こしたことがある人
2. 次の部位には使用しないでください。
(1)目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣など)、陰のう、外陰部など
(2)湿疹
(3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人
(2)妊婦又は妊娠している可能性のある人
(3)乳幼児
(4)本人又は家族がアレルギー体質の人
(5)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(6)患部が顔面又は広範囲の人
(7)患部が化膿している人
(8)「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人
(陰のうにかゆみ・ただれなどの症状がある場合は、湿疹など他の原因による場合が多い。)
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
(1)使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かぶれ、かゆみ、はれ、刺激感、熱感、 りんせつ らくせつ 鱗屑・落屑(フケ、ア カのような皮ふのはがれ)、ただれ、乾燥・つっぱり感、皮ふの亀裂

- (2)2週間位使用しても症状が良くならない場合や、本剤の使用により症状が悪化した場合

効能・効果

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし


用法・用量

1日1回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法を厳守してください。
- (2)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3)本剤のついた手で、目や粘膜にふれないでください。
- (4)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (5)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (6)外用にのみ使用してください。

〈チューブの穴の開け方〉
キャップを逆さにして、突起部をチューブの先に強く押し当てて開けてください。



成分・分量

(100g中)

成 分	含 量	は た ら き
テルビナフィン塩酸塩	1.0g	水虫菌(白癬菌)にすぐれた殺真菌作用を示します。
リドカイン	2.0g	患部のかゆみ・痛みを一時的にしのぎます。

添加剤:ポリソルベート60、モノステアリン酸ソルビタン、セタノール、ステアリルアルコール、パルミチン酸セチル、ポリオキシエチレンペンチルエーテル、ミリスチン酸イソプロピル、プロピレングリコール、ベンジルアルコール、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物 含有

保管及び取扱い上の注意


- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であってもなるべくはやく使用してください。

水虫の治療についてのアドバイス


1. 患部をよく洗い、清潔にしましょう。




2. 患部がむれないように、十分に乾かしましょう。



3. 靴、靴下、浴室のマットなども清潔にしましょう。



4. 治りきるまで、根気よく治療を続けましょう。



お問い合わせ先 株式会社 富士薬品 (学術室)
電話 (048) 648-1118 9:00~17:30 (土、日、祝日を除く)

製造販売元

株式会社 富士薬品
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地