



涙液の補助・目のつかれに アイリスCL-Iネオ

第3類医薬品

0.4mL×30本入

製品情報は
こちら



直射日光をさ
け、なるべく涼
しい所に保管
してください。

第3類医薬品
アイリスCL-Iネオ
0.4mL×30本入

開封口

▼清涼感レベル
なし 1 2 3 4 5

使用に際しては、この箱の説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1)医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3)次の症状のある人。はげしい目の痛み (4)次の診断を受けた人。緑内障
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。皮膚：発疹・発赤、かゆみ/目：充血、かゆみ、はれ 3. 次の場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1)目のかすみが改善されない場合。(2)2週間位使用しても症状がよくなる場合。

使用上の注意

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)(4)他の人と共用しないでください。(5)車のダッシュボード等高温下に放置しないでください。(容器の変形や薬液の品質が劣化することがあります)(6)スポンの後ろポケット等に製品を入れると、キャップがあくことがありますので、注意してください。(7)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。(品質保持のため)

発売元 製造販売元
大正製薬株式会社 ファーマパック株式会社
東京都豊島区高田3丁目24番1号 富山県富山市小中163番地
<https://brand.taisho.co.jp/iris/>

お客様119番室

03-3985-1800


※受付時間は、大正製薬ホーム
ページにてご確認ください

【用法・用量】

1日3～6回、1回2～3滴を点眼してください。

【使い方】

・無理にひっぱらず、キャップ部分を
ゆっくり回して開けてください。
・1本で両眼に点眼できます。



【注意】

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 容器の先をまぶた、まつ毛にふれさせないでください。また湿潤したものは使用しないでください。
- 点眼用にはのみ使用してください。
- いきおいよく開封すると、薬液が飛び散ることがありますので注意してください。
- 本剤は「1回使いきりタイプ」の点眼剤で、防腐剤を含有しておりませんので、使用後の残液は捨ててください。

1回使いきり清潔パック 30回分

涙液の補助・目のつかれに

アイリスCL-Iネオ



裸眼にも
コンタクトレンズ
装着時にも

防腐剤※
無添加

目薬



第3類医薬品

※防腐剤(ベンザルコニウム塩化物、パラベン)を配合しておりません

★すべてのコンタクト
レンズ(ソフト・
O2・ハード・使い
捨て)をしたまま
点眼できます。

★涙に近いやさしいさし心地です。



【効 能】

ハードコンタクトレンズ又はソフトコンタクトレンズを装着しているときの不快感、涙液の補助(目のかわき)、目のつかれ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

【成 分】

タウリン……………1.0%
塩化ナトリウム……………0.56%
塩化カリウム……………0.113%
添加物：炭酸水素Na、pH調節剤

副作用被害救済制度

0120-149-931

製造番号

使用期限(西暦年月)



4 987306 001046

エコパッケージ：添付文書をなくし、
紙の使用量を削減(従来品比)

41

