

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

目のかゆみ・充血に

アイリスAGユニット 〈目薬〉

◆アイリスAGユニットは、目の炎症・充血を効果的にしずめるやさしい
さし心地の目薬です。

◆防腐剤のっていない1回使いきりタイプです。



使用上の注意



相談すること



1 次の人は使用前に医師又は薬剤師に 相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。
はげしい目の痛み
- (5) 次の診断を受けた人。
緑内障

2 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って 医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- (2) 目のかすみ改善されない場合。
- (3) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

効 能

目のかゆみ、結膜充血、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、目のかすみ(目やにの多いときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、目のつかれ、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

成 分

成 分	分量	はたらき
イプシロン-アミノカプロン酸	1.0%	抗炎症作用により、目の炎症をしずめます。
グリチルリチン酸二カリウム	0.25%	
マレイン酸クロルフェニラミン	0.03%	不快な目のかゆみをおさえます。
塩酸テトラヒドロソリン	0.05%	目の充血をおさえます。
アミノエチルスルホン酸(タウリン)	1.0%	栄養を与え、目のつかれをやわらげます。
コンドロイチン硫酸ナトリウム	0.1%	角膜の乾燥を防いで、目を保護します。

添加物：ホウ酸、pH調節剤、等張化剤、エデト酸Na

〔注意〕


本剤の点眼後、口中に甘みを感じることがありますが、甘みは有効成分のグリチルリチン酸二カリウムによるものですから、ご心配ありません。

用法・用量

1日3～6回、1回2～3滴を点眼してください。

【使い方】

①無理にひっぱらず、キャップ部分をゆっくり回して開けてください。



②1日3～6回、1回2～3滴を点眼してください。(1本で両眼に点眼できます)



③容器には、薬液が押し出しやすいように、やや多く入っていますが、一度開封したものは、液が残っていても必ず捨ててください。



プラスチックとして分別してください。

【注意】

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4)容器の先をまぶた、まつ毛にふれさせないでください。また混濁したものは使用しないでください。
- (5)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (6)点眼用にのみ使用してください。
- (7)無理にひっぱって開封しないでください。また、いきおいよく開封すると、薬液が飛び散ることがありますので注意してください。
- (8)本剤は「一回使いきりタイプ」の点眼剤で、防腐剤を含有しておりませんので、使用後の残液は捨ててください。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)車のダッシュボード等高温下に放置しないでください。(容器の変形や薬液の品質が劣化することがあります)
- (6)ズボンの後ろポケット等に製品を入れると、キャップがあくことがありますので、注意してください。
- (7)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべくはやく使用してください。(品質保持のため)



目薬をさす時の注意と正しいさし方

注意

- 容器の先がまぶたやまつ毛にふれると、目やにや雑菌等のため、薬液が汚染又は混濁することがありますので注意してください。

正しいさし方

- 手をよく洗い、目に直接指がふれないようにしてください。
- やや上を向いて指で下まぶたをさげ、まぶたの裏側にしずくを落としてください。



容器の先で目を傷つけないように注意してください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いいたします。



連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室
電話 03-3985-1800
受付時間 8:30～21:00(土、日、祝日を除く)

発売元

大正製薬株式会社
東京都豊島区高田3丁目24番1号
<http://www.taisho.co.jp>

製造販売元

ファーマパック株式会社
富山県富山市小中163番地

SG5E1