

2011年12月改訂（記載要領変更に伴う改訂）

この説明書は、本剤とともに
保管し、服用の際には、よくお読みください。

シュガーレス〈クールオレンジ味〉

鎮咳去痰薬

浅田飴せきどめ

第2類医薬品

【ご使用上の注意】



してはいけないこと



[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]
本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬

相談すること



- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人(3)授乳中の人(4)高齢者(5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(6)高熱のある人(7)心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害の診断を受けた人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能・効果】

せき、ぜんそく、たん、のどの
炎症による声がれ、のどのあれ、のどの
不快感、のどの痛み、のどのほれ

【用法・用量】

次の量を口の中に含み、かまずにゆっくり溶かして服用してください。服用間隔は2時間以上おいてください。

年 齢	1回量	服用回数
11才以上	2錠	1日6回
5才以上11才未満	1錠	
5才未満	服用しないこと	

- 定められた用法、用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】12錠中

dl-メチルエフェドリン塩酸塩……37.5mg クレゾールスルホン酸カリウム……135mg
セチルピリジニウム塩化物水和物……3mg

添加物として還元水アメ、還元麦芽糖水アメ、グリチルリチン酸2K、オレンジ油、アラビ
アゴム、カルナウバロウ、カラメル、L-メントール、クエン酸、タルク、サラシミツロウ、シリ
コーン樹脂、ソルビタン脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、繊維素グリコール
酸Na、香料含有

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 5才未満の乳幼児の場合には、のどにつかえるおそれがありますので服用を
さけてください。(2) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にフタ
をしっかりとめて保管してください。(3) 小児の手の届かない所に保管し
てください。(4) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になっ
たり品質が変化します)。(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでく
ださい。

製造販売元

A株式会社 浅田 飴

東京都東村山市久米川町5-29-7

お問合せ先 03-3953-4044

1211M2