

この説明書は、本剤とともに
保管し、服用の際には、よくお読みください。

シュガーレスくストロベリー味

鎮咳去痰薬 浅田飴子供せきどめドロップS

【ご使用上の注意】

してはいけないこと 

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。〕

本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬

相談すること 

■ 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 授乳中の人 (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人 (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (6) 次の症状のある人 高熱 (7) 次の診断を受けた人
心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

(2) 5～6回服用しても症状がよく
ならない場合

【効能・効果】

せき、ぜんそく、たん、のどの
炎症による声がれ・のどのあれ・のどの
不快感・のどの痛み・のどのはれ

【用法・用量】

次の量を口の中に含み、かまずにゆっくり溶かして服用してください。
服用間隔は2時間以上おいてください。

年 齢	1回量	服用回数
8才以上15才未満	2錠	1日6回
5才以上8才未満	1錠	
5才未満	服用しないこと	

- 定められた用法、用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】12錠中

成 分	分量	作 用
dℓ-塩酸メチルエフェドリン	25mg	せきを鎮めます。
クレゾールスルホン酸カリウム	90mg	たんを出しやすくします。
塩化セチルピリジニウム	3mg	炎症を防ぎます。

添加物として還元水アメ、還元麦芽糖水アメ、グリチルリチン酸二カリウム、アセスル
ファミカリウム、アスコルビン酸、アラビアゴム、カルナウバロウ、タルク、サラシミツ
ロウ、香料、プロピレングリコール含有

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にフタをしっかりとめて保
管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の
容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変化し
ます。)(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

製造販売元

A 株式会社 浅田 飴

東京都東村山市久米川町5-29-7

お問合せ先 03-3953-4044

1105◎2