


(3)煎じ方

水約100mLの中へ1包を入れ、軽く泡立つ程度の弱火で約半量(10～15分)に煎じて火を止め、袋を取り出してください。

1日3回(朝、昼、夜)そのつど煎じたものを食間または食前に服用してください。



成分・分量

1日量3包(1.5g)中、次の成分を含有する。

成分	1日量3包(1.5g)中
日本薬局方センブリ	1.5g

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限をすぎたものは服用しないこと。

内 容 量

0.5g×12包(6g)

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

本草製薬株式会社 お客様相談室
〒468-0046 名古屋市中天白区古川町125番地
電 話：052-892-1287(代表)
受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)


【副作用被害救済制度のお問い合わせ先】
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電 話 0120-149-931(フリーダイヤル)

本草製薬株式会社
名古屋市中天白区古川町125番地



せんぶり

第3類医薬品



せんぶり

Swertia japonica Makino

服用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

健胃薬

本草センブリ(分包)05

日本薬局方センブリ

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の方は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
医師の治療を受けている人。
2. 次の場合は、服用を中止し、この文書を持って
医師又は薬剤師に相談すること
1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

効能・効果

胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき

用法・用量

大人(15歳以上)は、1回1包(0.5g)を1日3回食間または食前に、水約100mLをもつて煮て約半量に煮つめ汁をこして取り去り服用する。あるいは熱湯中に浸して振り出し、その振出液を服用する。

11歳以上	15歳未満	大人の2/3量
8歳以上	11歳未満	大人の1/2量
5歳以上	8歳未満	大人の1/3量
3歳以上	5歳未満	大人の1/4量
1歳以上	3歳未満	大人の1/5量
3ヵ月以上	1歳未満	大人の1/10量

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。