

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

便秘薬 本草どくだし煎

本草どくだし煎は、低下している腸のぜん動運動を高めます。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
3. 大量に服用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。
はげしい腹痛、悪心・嘔吐
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ*
消化器	はげしい腹痛、悪心・嘔吐

- (2) 1週間位服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
下痢

効 能・効 果

便秘

便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔

用法・用量

大人(15歳以上)は1日1/4包～1包につき、水1,000mLをもって600mLまで煮つめ、カスを取り去り、3回に分けし食前に服用すること。

ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量すること。

- | | |
|------------|---------|
| 11歳以上15歳未満 | 大人の2/3量 |
| 7歳以上11歳未満 | 大人の1/2量 |
| 3歳以上7歳未満 | 大人の1/3量 |
| 3歳未満 | 服用しないこと |

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

1包(15.0g)(大人の1日最大服用量)中、次の成分を含有する。

成分	1包(15.0g)(大人の1日最大服用量)中	主な作用
日本薬局方ダイオウ	2.0g	大腸に直接作用して、低下している腸のぜん動運動を高めます。
日本薬局方ケツメイシ	1.0g	瀉下補助緩和作用を示します。
日本薬局方サンキライ	0.5g	瀉下補助緩和作用を示します。
日本薬局方ジュウヤク	3.0g	瀉下補助緩和作用を示します。
日本薬局方ヨクイニン	8.5g	瀉下補助緩和作用を示します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限をすぎたものは服用しないこと。

内 容 量

15g×9包(135g)

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

本草製薬株式会社 お客様相談室

〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目6番21号

電 話：052-951-0611 (代表)

受付時間：月～金曜日 9：00～17：00

(土、日、祝祭日を除く)

Ⓢ 本製薬株式会社
名古屋市中区丸の内三丁目125番地

