

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

便秘薬 本草ジュウヤク(分包)5 日本薬局方 ジュウヤク

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬(下剤)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 次の症状のある人。

はげしい腹痛、悪心・嘔吐

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って
医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	はげしい腹痛、悪心・嘔吐

(2) 1週間位服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような
症状の継続又は増強が見られた場合には、服用
を中止し、医師又は薬剤師に相談すること

下痢

効能・効果

便秘、尿量減少、便秘に伴う吹出物

用法・用量

大人(15歳以上)は、1回1包(5g)を1日3回食
間または食前に、水約200mLをもって煮て約150
mLに煮つめ^{かす}滓をこして取り去り服用する。


15歳未満の小児は服用しないこと。

〈用法・用量に関連する注意〉

煎じ方

水約200mLの中へ1包を入れ、軽く泡立つ程度
の弱火で約150mL(10～15分)に煎じて火を止め、
袋を取り出してください。

1日3回(朝、昼、夜)そのつど煎じたものを食
間または食前に服用してください。



成分・分量

1日量3包(15g)中、次の成分を含有する。

成分	1日量3包(15g)中
日本薬局方ジュウヤク	15g

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい
所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限をすぎたものは服用しないこと。

内 容 量

5g×24包(120g)

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は
下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

本草製薬株式会社 お客様相談室

〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目6番21号

電 話：052-951-0611 (代表)

受付時間：月～金曜日 9：00～17：00

(土、日、祝祭日を除く)



本草製薬株式会社
名古屋市天白区古川町125番地

