


じゅうやく

〈用法・用量に関連する注意〉

煎じ方

水約200mLの中へ1包を入れ、軽く泡立つ程度の弱火で約150mL(10～15分)に煎じて火を止め、袋を取り出してください。

1日3回(朝、昼、夜)そのつど煎じたものを食間または食前に服用してください。



成分・分量

1日量3包(15g)中、次の成分を含有する。

成分	1日量3包(15g)中
日本薬局方ジュウヤク	15g

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限をすぎたものは服用しないこと。

内 容 量

5g×26包(130g)

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
本草製薬株式会社 お客様相談室
〒468-0046 名古屋市天白区古川町125番地
電 話：052-892-1287(代表)
受付時間：9：00～17：00(土、日、祝日を除く)

【副作用被害救済制度のお問い合わせ先】
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電 話 0120-149-931(フリーダイヤル)

本草製薬株式会社
名古屋市天白区古川町125番地



PP

第3類医薬品

服用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

便秘薬 本草ジュウヤク(分包)5 日本薬局方 ジュウヤク

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬(下剤)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 次の症状のある人。
はげしい腹痛、悪心・嘔吐

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	はげしい腹痛、悪心・嘔吐

- (2) 1週間位服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
下痢

効能・効果

便秘、尿量減少、便秘に伴う吹出物

用法・用量

大人(15歳以上)は、1回1包(5g)を1日3回食間または食前に、水約200mLをもって煮て約150mLに煮つめ^{ひた}滓をこして取り去り服用する。

15歳未満の小児は服用しないこと。



どくだみ

Houttuynia cordata Thunberg