

下線部:2002年7月に追記しました。

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

漢方製剤

本草 柴胡桂枝湯エキス顆粒ーH

本草柴胡桂枝湯エキス顆粒ーHは漢方処方「柴胡桂枝湯」を煎じて服用する不便をなくし、簡便に服用出来るようにエキス顆粒（分包）とした製品です。

使用上の注意

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）
次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。

🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
- (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)高齢者。
 - (4)今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (5)次の症状のある人。
むくみ
 - (6)次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
- (1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
その他	頻尿、排尿痛、血尿、残尿感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間 質 性 肺 炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
肝 機 能 障 害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。

- (2)1ヵ月位（かぜの場合には1週間位）服用しても症状がよくならない場合
3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

効能・効果

多くは腹痛を伴う胃腸炎、微熱・寒け・頭痛・はき気などのある感冒、風邪の後期の症状
(裏面もお読み下さい)

用法・用量

次の量を1日2回朝夕の食前又は食間に服用すること。

年齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	1包	2回
7歳以上15歳未満	2／3包	
4歳以上7歳未満	1／2包	
2歳以上4歳未満	1／3包	
2歳未満	1／4包	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2)1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

成分・分量

2包(大人1日服用量)中、次の成分を含有する。

成分	2包(5.0g)中
柴胡桂枝湯水製乾燥エキス末 〔日本薬局方サ イ コ…3.33g 日本薬局方ニンジン…1.33g 日本薬局方ハ ン ゲ…2.67g 日本薬局方タイソウ…1.33g 日本薬局方ケ イ ヒ…1.67g 日本薬局方カンゾウ…1.00g 日本薬局方シャクヤク…1.67g 日本薬局方ショウキョウ…0.67g 日本薬局方オウゴン…1.33g より抽出。〕	2.31g

添加物として、乳糖、セルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Mgを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4)使用期限をすぎたものは服用しないこと。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
本草製薬株式会社 お客様相談室
〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目6番21号
電 話：052-951-0611（代表）
受付時間：月～金曜日 9:00～17:00（土、日、祝祭日を除く）

1656 本草製薬株式会社
名古屋市中区丸の内三丁目6番21号

2J020A