

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

漢方製剤

本草 防已黄耆湯エキス錠－H

ほんぞうぼういおうぎとう ぼういおうぎとう
本草防已黄耆湯エキス錠－Hは漢方処方「防已黄耆湯」を煎じて服用する
不便をなくし、簡便に服用出来るようにエキス錠とした製品です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間 質 性 肺 炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。
肝 機 能 障 害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。

(2)1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

効能・効果

色白で疲れやすく、汗のかきやすい傾向のある次の諸症：肥満症（筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり）、関節痛、むくみ

用法・用量

次の量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	4錠	3回
7歳以上15歳未満	3錠	
5歳以上7歳未満	2錠	
5歳未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

（裏面もお読み下さい）

成分・分量

12錠〔大人1日服用量〕中、次の成分を含有する。

成分	12錠中
防已黄耆湯水製乾燥エキス末 〔日本薬局方ボ イ …2.50g 日本薬局方タ イ ソ ウ …1.50g〕 〔日本薬局方オ ウ ギ …2.50g 日本薬局方カン ソ ウ …0.75g〕 〔日本薬局方ビャクジュツ …1.50g 日本薬局方ショウキョウ …0.50g〕 より抽出。	1.60g

添加物として、乳糖、炭酸Ca、セルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、クロスカルメロースナトリウム・A型、ステアリン酸Mgを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限をすぎたものは服用しないこと。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

本草製薬株式会社 お客様相談室

〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目6番21号

電 話：052-951-0611（代表）

受付時間：月～金曜日 9:00～17:00（土、日、祝祭日を除く）



本草製薬株式会社

名古屋市天白区古川町125番地