

下線部：2004年4月に追記しました。

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

漢方製剤

本草 防風通聖散エキス錠－H

ほんぞうふうとうしょうせいこうさん

本草防風通聖散エキス錠－Hは漢方処方「防風通聖散」を煎じて服用する不便をなくし、簡便に服用出来るようにエキス錠とした製品です。

ほうふうとうしょうせいこうさん

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - (4)胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - (5)発汗傾向の著しい人。
 - (6)高齢者。
 - (7)今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (8)次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
 - (9)次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	腹痛、胃部不快感、はげしい腹痛を伴う下痢

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
肝 機 能 障 害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。

- (2) 1 ヶ月位（便秘に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合

（裏面もお読み下さい）

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること
4. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること

下痢

効能・効果

腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症：肥満症、便秘、むくみ、高血圧の随伴症状（どうき、肩こり、のぼせ）。

用法・用量

次の量を1日3回食前または食間に服用すること。

年齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	4錠	3回
15歳未満	服用しないこと	

成分・分量

12錠〔大人1日服用量〕中、次の成分を含有する。

成分	12錠中
防風通聖散水製乾燥エキス末 （日本薬局方キキョウ…1.00g 日本薬局方サンシシ…0.60g） 日本薬局方ビャクジュツ…1.00g 日本薬局方レンギョウ…0.60g 日本薬局方カンソウ…1.00g 日本薬局方ハツカ…0.60g 日本薬局方オウゴン…1.00g 日本薬局方ケイガイ…0.60g 日本薬局方セッコウ…1.00g 日本薬局方ボウフウ…0.60g 日本薬局方ダイオウ…0.75g 日本薬局方マオウ…0.60g 日本薬局方トウキ…0.60g 日本薬局方ショウキョウ…0.20g 日本薬局方シャクヤク…0.60g カッセキ…1.50g 日本薬局方センキュウ…0.60g ポウショウ…0.75g より抽出。	2.50g

添加物として、セルロース、炭酸Ca、酸化チタン、メタケイ酸アルミン酸Mg、クロスCMC-Na、ステアリン酸Mgを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4)使用期限をすぎたものは服用しないこと。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

本草製薬株式会社 お客様相談室

〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目6番21号

電話：052-951-0611（代表）

受付時間：月～金曜日 9:00～17:00（土、日、祝祭日を除く）



本草製薬株式会社

名古屋市天白区古川町125番地