

デリケートな部位の炎症を抑え、かゆみを鎮めます。

デリケーション

鎮痒消炎薬

こんな症状に

生理時のかゆみ おりものによるかゆみ 陰部周辺部のかゆみ
ナプキン・おりものシート使用時のかぶれ
下着の締め付けによるかゆみ 乾燥肌によるかゆみ あせもなど



〔デリケーションの特長〕

- 1. 非ステロイド系、べとつかないさわやかな使用感のクリームタイプのかゆみ止め薬です。
- 2. さまざまな刺激によるかゆみの原因物質をブロックし、不快なかゆみを抑えます。
- 3. 血流改善作用、消炎作用により、皮膚のトラブルを改善します。
- 4. かゆみや炎症の原因となっている雑菌の繁殖を抑え、皮膚を清潔に保ちます。



使用上の注意



相談すること

- 1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (3) 薬や化粧品等によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 湿潤やただれのひどい人
- 2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

※ カンジダ症、トリコモナス症などの原因によるかゆみは、医師による治療が必要です。

裏面も必ずお読みください

〔効能・効果〕

かゆみ、かぶれ、湿疹、皮膚炎、ただれ、じんましん、あせも、虫さされ、しもやけ

〔用法・用量〕

1 日数回、適量を患部に塗布してください。

＜用法・用量に関する注意＞

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診断を受けてください。
- (4) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (5) 粘膜部分には使用しないでください。

〔成分・分量〕

成 分	含 量 (100g中)	は た ら き
ジフェンヒドラミン	1.0 g	抗ヒスタミン作用でかゆみの原因物質をブロックします。
リドカイン	1.0 g	局所麻酔作用でかゆみを素早く鎮めます。
トコフェロール酢酸エステル	0.5 g	血流改善作用で新陳代謝を促進し、患部の治りを助けます。
グリチルレチン酸	0.2 g	消炎作用で皮膚のトラブルを改善します。
イソプロピルメチルフェノール	0.1 g	殺菌作用で雑菌の繁殖を防ぎます。

添加物として、モノステアリン酸グリセリン、ベヘニルアルコール、パルミチン酸セチル、カルボキシビニルポリマー、パルミチン酸イソプロピル、スクワラン、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ジメチルポリシロキサン、1,3-ブチレングリコール、クエン酸を含有します。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (2) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4) 使用期限（ケース及びチューブに記載）をすぎた製品は使用しないでください。

製品についてのお問い合わせ

- お買い求めの販売店
- ジャパンメディック株式会社 お客様相談窓口：076-438-1107
〔受付時間：月～金（祝祭日・年末年始を除く）9：00～17：00〕

副作用被害救済制度の問合せ先
（独）医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）