

食べる前にも・食べた後にも 効く胃腸薬

第2類医薬品

# サンラックミン®G

(ウルソデオキシコール酸・ニンジン・センブリ配合)

## 本剤の特徴

- 食べる前にも後にも、胃の働きをよくしてくれる胃腸薬です。
  - ・ 食べる前にのむと、弱っている胃の機能を改善しながら、胃の働きをよくしてくれます。
  - ・ 食べた後やのんだ後に、胃もたれやおなかの張りが続く、胸がやける、胸がつかえるときなどに、この薬をのむと胃内容物の排出を促進し、脂肪の消化を助けながら胃の調子を整えてくれます。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。

透析療法を受けている人

2. 長期連用しないでください。



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 次の診断を受けた人  
腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書をもって医師又は薬剤師に相談して下さい。

- (1) 2週間位服用しても症状の改善がみられない場合

3. 次の症状が現れることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

| 部 位 | 症 状   |
|-----|-------|
| 腹 部 | 便秘、下痢 |

## 効能又は効果

- 食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、はきけ(むかつき)、胃のむかつき、二日酔い・悪酔いのむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、消化促進、消化不良による胃部・腹部膨満感

## 用法及び用量

次の1回量を1日3回食前又は食後に、水又は白湯で服用してください。

| 年齢     | 1 回服用量      |     | 1 日服用回数 |
|--------|-------------|-----|---------|
| 15歳以上  | 3錠          | 〇〇〇 | 3 回     |
| 11～14歳 | 2錠          | 〇〇  |         |
| 8～10歳  | 1・1／2錠      | 〇①  |         |
| 5～7歳   | 1錠          | 〇   |         |
| 5歳未満   | 服用しないでください。 |     |         |

### <用法及び用量に関連する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 5歳未満のお子さまには服用させないでください。
- (3) 1錠を分割した残りを服用する場合には、清潔な紙につつま外箱中に保管し、2日以内に服用してください。
- (4) 錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



## 成分及び分量

| 成分              | 分量(9錠中) | 作用                                                            |
|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| ウルソ<br>デオキシコール酸 | 60mg    | 熊胆(ユウタン)の薬効成分で、利胆作用(肝臓の働きを活発にし、胆汁の分泌を促進)と共に消化管機能を改善する作用があります。 |
| 炭酸水素ナトリウム       | 500mg   | 胸やけの原因となる胃酸をすばやく中和します。                                        |
| 合成ヒドロタルサイト      | 100mg   | 持続的な制酸効果により胃粘膜を保護します。                                         |
| ケイヒ末            | 300mg   | 食欲不振、消化不良に効く健胃生薬です。                                           |
| ニンジン末           | 120mg   |                                                               |
| ショウキョウ末         | 90mg    |                                                               |
| センブリ末           | 10mg    |                                                               |

添加物として、グリチルリチン酸2K、オウバク、L-メントール、トウモロコシデンプン、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、タルクを含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) お子さまの手のとどかない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。

### 製品についてのお問い合わせ

・お買い求めの販売店  
・ジャパンメディック株式会社 お客様相談窓口:076-438-1107  
[受付時間:月～金(祝祭日・年末年始を除く)9:00～17:00]

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元

ジャパンメディック株式会社  
富山県富山市横越168