

Repairs the skin's barrier function and
improves painful dry roughness.
Contains human ceramides.

Dry and Rough Skin Repair

Once to
several times
a day

50g

matsukiyo

開封口

第2類
医薬品

販売名：ヒルメナイドプレミアムクリーム

特徴

- 肌表面に長くとどまり、外部の刺激から患部を守ります。
- 赤ちゃんから使える保湿クリームです。
- 無香料・無着色 ○ステロイドフリー
- エタノールフリー

※顔面のきず・やけどのあとの皮ふのしこり・つっぱりには使用しないでください。



肌本来の姿とは？

外部の刺激からからだを守るのと同じように、水分が逃げるのを防ぐチカラ(バリア機能)をもつ肌のことです。

ご使用に際して、この箱の説明書を必ずお読みください。また、必要ときに認めるよう大切に保管してください。



ミックス
木材
FSC® C111644



パイオマス
使用部分：白紙・ピンク
No.190146



4 956622 110848

乾燥が気になる

顔 手 からだ

などにご使用ください。

効能・効果

手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかとくるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮膚、しもやけ(ただれを除く)、きず・やけどのあとの皮ふのしこり・つっぱり(顔面を除く)、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

用法・用量

1日1～数回、適量を患部に塗り込むか、またはガーゼ等にのばして貼ってください。

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合にはすぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には医師の診療を受けてください。
- (3)外用にのみ使用してください。

成分・分量 (100g中)

ヘパリン類似物質……………0.3g
パンテノール……………1g
グリチルリチン酸二カリウム……………0.5g
トコフェロール酢酸エステル……………0.5g
添加物N-ステアロイルジヒドロスフィンゴシン、N-(ヘキサデシロキシヒドロキシプロピル)-N-ヒドロキシエチルヘキサデカナミド、フィトステロール、ポリオキシエチレンヘニルエーテル、モノステアリン酸グリセリン、セトステアリルアルコール、流動パラフィン、α-オレフィンオリマー、ジメチルポリシリコン、トリス(オクタン酸)グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、濃グリセリン、パラベン、クエン酸Na、クエン酸

保管及び取扱上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かないところに保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。

※この商品は(株)マツキョコカラカンパニーのオリジナル商品です。

matsukiyo

Dry and Rough Skin Repair

乾燥性皮膚治療薬

ヒルメナイドプレミアムクリーム

乾燥肌の
バリア機能を
修復し肌本来の姿へ

PREMIUM

クリーム

無香料・無着色

ヒト型
セラミド
※1

薬のはたらき

乾燥肌

ヘパリン類似物質：
0.3g

パンテノール：1g

グリチルリチン酸二カリウム：
0.5g

トコフェロール酢酸エステル：
0.5g

第2類医薬品

※1 添加物としてN-ステアロイルジヒドロスフィンゴシン(ヒト型セラミドの一種)配合

角化症

・血行を促進し、
皮膚を保湿します

・乾燥による荒れを修復します

・乾燥による
赤みに作用します

・血行を促し、肌の
修復を助けます

100g中

使用上の注意

※してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください。
(1)出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病など)の人
(2)わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人(血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがあります)
2. 次の部位には使用しないでください。
目、粘膜(口腔、鼻腔、経など)

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(3)潤滑やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性ががありますので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

製造販売元
ジャパンメディック株式会社
富山県富山市横越168

お客様相談窓口
☎076-438-1107
受付時間：月～金9:00～17:00
(祝日・年末年始を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

台量取端
部領出第



管理コード 412161A1