

# 頭皮の 湿疹に

## 7つの 有効成分が効く

**PVA**  
アンテドラッグ型  
抗炎症成分

イソプロピルメチル  
フェノール  
殺菌作用

リドカイン  
局所麻酔作用

ジフェン  
ヒドラミン塩酸塩  
かゆみどめ成分

l-メントール  
清涼感


トコフェロール  
酢酸エステル  
血行促進成分

グリチルレチン酸  
抗炎症成分

爽やかな  
使い心地

### 容器の使用方法

- 使用前に、容器の先端を上に向けて、手の指で中栓の先を数回押し、中の空気を抜いてください。(暑い時期や、高温の場所に置かれた場合、また薬液が少なくなった場合などに、薬液が多く出ることを防ぐためです。)
- 使用するときは容器を下向き又は斜めにして、先端を患部に軽く押し当てて塗布してください。(容器の先端を患部から離すと液が出なくなります。)先端を強く押し当てたり、容器胴部を強く押すと薬液が多く出ますので注意してください。



大容量 <sup>セルフメディケーション  
税 除 除 対 象</sup>  
30mL

直接塗って  
かゆみ  
を抑える!!

マエックHDプラス



マエックHDプラス  
特徴

第②類医薬品

1 たれにくい液体

適度な粘度のある液体で、患部にとどまります。

2 塗りやすい容器

容器の先端を頭皮に直接押し当てるため、髪や手を汚しません。

3 アンテドラッグ  
ステロイド配合

患部で作用を発揮し、体内では低活性となるステロイド剤を配合しています。

鎮痒消炎薬



第②類医薬品



### △ 使用上の注意

❌ **【してはいけないこと】** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 1. 次の部位には使用しないでください。(1) 水瘡(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。(2) 創傷面、目の周囲、粘膜。2. 顔面には、広範囲に使用しないでください。3. 長期連用しないでください。

❗ **【相談すること】** 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4) 患部が広範囲の人。(5) 湿潤やたれのひどい人。2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

ご使用に際して、この箱の説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

マエックHDプラス 第②類医薬品 30mL

効能・効果 かゆみ、湿疹、皮ふ炎、あせも、かぶれ、虫さされ、じんましん

成分・分量 (100mL中)

成分	分量
プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル(PVA)	0.15g
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2.0g
グリチルレチン酸	0.2g
イソプロピルメチルフェノール	0.1g
リドカイン	1.0g
l-メントール	3.5g
トコフェロール酢酸エステル	0.5g

添加物として、乳酸、アジピン酸ジイソプロピル、ヒドロキシプロピルセルロース、1,3-ブチレングリコール、イソプロパノール、エタノールを含有します。

用法・用量 1日数回、適量を患部に塗布してください。

<用法・用量に関連する注意> (1) 定められた用法・用量をお守りください。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3) **目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。**(4) 染めた髪につくと色落ちする場合がありますので、ご使用に際しては、注意してください。(5) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

<保管及び取り扱い上の注意> (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して立てて保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4) 火気に近づけないでください。(5) 液がたれないように注意して使用してください。(6) 時計、メガネ等の金属類、プラスチック類、化学繊維類、皮革製品、塗装のしたる床・家具等に付着すると変質することがありますので、付着しないよう注意してください。(7) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製造販売元 **ジャパンメディック株式会社**  
富山県富山市横越168

お客様相談窓口：076-438-1107

受付時間：月～金(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931