

服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

解熱鎮痛薬 ネオノ-ラクA

本剤は2種類の非ピリン系解熱鎮痛成分アセトアミノフェン、エテンザミドに鎮痛効果を促進する2つの成分ブロムワレリル尿素および無水カフェインをバランスよく配合し、各成分の作用により、すぐれた鎮痛および解熱効果を発揮します。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤または他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと

他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬

3. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないこと (眠気があらわれることがある。)

4. 服用時は飲酒しないこと

5. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 水痘 (水ぼうそう) 若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児 (15才未満)。
- (5) 高齢者。
- (6) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (7) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (8) 次の診断を受けた人。 心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
シ ョ ッ ク (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、 顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい 症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝 機 能 障 害	全身のだるさ、黄疸 (皮ふや白目が黄色くなる) 等が あらわれる。
ぜ ん そ く	

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合。

効能・効果

- 1) 頭痛・歯痛・神経痛・肩こり痛・月経痛（生理痛）・関節痛・腰痛
筋肉痛・咽喉痛・耳痛・打撲痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛
- 2) 悪寒・発熱時の解熱

用法・用量

次の量を、なるべく空腹時をさせて水またはお湯で服用する。
服用間隔は6時間以上おくこと。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
大人（15才以上）	4錠	2回を限度とする
8才以上15才未満	2錠	
5才以上8才未満	1錠	
5才未満の乳幼児	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

8錠（大人1日量）中に次の成分を含んでいます。

成 分	含 量	成 分	含 量
アセトアミノフェン	600mg	無水カフェイン	210mg
エテンザミド	720mg	ブロムワレリル尿素	300mg

添加物としてケイ酸Al、カルメロースCa、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、ステアリン酸Mgを含有する。

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 配置期限を過ぎた製品は、服用しないこと。

■ お問い合わせ先 増田製薬株式会社 お客様相談係 電話 0744-27-4381
[受付時間 9時から17時まで 土、日、祝日を除く]

たい印



製造販売元

増田製薬株式会社

奈良県橿原市川西町429