

この説明書は、本剤とともに保管し
服用の際にはよくお読みください

かぜ薬

フボシピタートンG[®]

サリチルアミド、アセトアミノフェン、d1-塩酸メチルエフェドリン、マレイン酸クロルフェニラミンなどに、和漢薬の牛黄を配合したかぜによる不快な症状を緩和する薬です



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり副作用・事故が起こりやすくなります)

1 次の人は服用しないこと

- (1) 今までにこの医薬品でアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) 今までにこの医薬品、又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人

2 この医薬品を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)

3 この医薬品の服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと

(眠気があらわれることがある)

4 服用時は飲酒しないこと

5 長期連用しないこと



相談すること

1 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 授乳中の人
- (4) 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている、又はその疑いのある乳、幼、小児(15才未満)
- (5) 高齢者
- (6) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (7) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (8) 次の症状の人
高熱、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹、発赤、かゆみ
消 化 器	悪心、嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる

症状の名称	症 状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる
間質性肺炎	空せき（たんを伴わないせき）を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。（これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。）
ぜんそく	

（2）5～6回服用しても症状がよくなる場合

3 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること

口のかわき

効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

用法用量

次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に服用してください

カプセルはかまずにそのまま服用してください

年齢	1回服用量
15才以上	2カプセル
7才以上15才未満	1カプセル
7才未満	服用させないこと

＜用法用量に関する注意＞

- （1）この医薬品は定められた用法用量を厳守してください
- （2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください

成分と働き 6カプセル（大人1日量）中

成 分	6カプセル中 （1日量）	働 き
サリチルアミド	810mg	熱をさげ痛みをやわらげます
アセトアミノフェン	450mg	
d1塩酸メチル エフェドリン	50mg	たんをでやすくする
マイレン酸 クロルフェニラミン	7.5mg	はなみずをおさえる
無水カフェイン	75mg	頭痛を緩和する
ゴオウ（牛黄）	6mg	解熱、鎮静作用

添加物としてタルク、セルロース、バレイシヨデンプン、とカプセルにラウリル硫酸ナトリウム、酸化チタンを含有する

保管及び取扱い上の注意

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください
- （2）小児の手の届かない所に保管してください
- （3）誤用をさげ品質を保持するため他の容器に入れ替えないでください
- （4）表示の期限の過ぎたものは服用しないでください

くすり相談窓口

お問い合わせ先 松井製薬（株）
電話（076）421-6061
受付時間 午前9時から午後4時まで
（土、日、祝日を除く）



製造発売元

松井製薬株式会社

☎930-0058 富山市古鍛冶町 7-7