

この説明書は、本剤とともに保管し
服用の際にはよくお読みください

下痢止め薬

ビクチ赤玉はろ薬

殺菌作用と収斂作用があるタンニン酸ベルベリンにゲンノショウコのエキスを配合した下痢止めにきく、飲みやすい小粒の薬です



使用上の注意

■ 相談すること

1 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人
- (3) 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人
(この医薬品で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがある)

(4) 高齢者

2 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、皮ふに発疹があらわれた場合
- (2) 5～6日間服用しても症状がよくならない場合

効能・効果

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便

用法・用量

次の1回量を1日2回服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください

年 齢	1回服用量
15才以上	20粒
11才以上15才未満	15粒
8才以上11才未満	10粒
5才以上8才未満	7粒

(裏面もお読み下さい)

＜用法・用量に関する注意＞

- (1) この医薬品は定められた用法用量を厳守してください
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください

成分と働き

40粒（大人1日量）中

成 分	40粒中(1日量)	働 き
タンニン酸ベルベリン	150mg	殺菌と収斂作用
ゲンノショウコエキス	170mg (原生薬680mg相当)	収斂作用

添加物としてパラベン、タルク、炭酸Ca、アルファー化デンプン、バレイショデンプン、カルメロースCa、セルロース、リン酸水素Ca、アラビアゴム、寒梅粉、酸化チタン、精製セラック、黄色5号、赤色3号を含有する

保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください
- (3) 誤用をさけ品質を保持するため他の容器に入れ替えないでください
- (4) 1包を分割した残りを使用する時は、袋の口を折り返して保管し2日以内に使用してください

くすり相談窓口

お問い合わせ先

松井製薬㈱

電話 (076)421-6061

受付時間

午前9時から午後4時まで

(土、日、祝日を除く)

製造元

松井製薬株式会社

☎930-0058 富山市古鍛冶町7-7

販売元

 **ピクチ薬品株式会社**

大阪府東大阪市鴻池徳庵町1番6号