

この説明書は、本剤とともに保管し
服用の際にはよくお読みください

鎮咳去痰薬

新コンスト®K

かぜひきからの咳はウイルスによる気道粘膜の炎症からが原因ですが、この炎症を鎮め痰をでやすくする、飲みやすい顆粒状の薬です



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり副作用・事故が起こりやすくなります)

- 1 この医薬品を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬
(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬) 鎮静薬
- 2 授乳中の人はこの医薬品を服用しないか、この医薬品を使用する場合は授乳を避けること



相談すること

- 1 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 授乳中の人
 - (4) 高齢者
 - (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (6) 薬によりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人
 - (7) 次の症状のある人
高熱
 - (8) 次の診断を受けた人
心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害、てんかん
- 2 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹、発赤、かゆみ
消 化 器	悪心、嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	動悸

- (2) 5～6回服用しても症状がよくなりえない場合
- 3 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
便秘

効能・効果

たん、せき

用法・用量

次の1回量を1日3回 毎食後に服用してください

年 齢	1回服用量
15才以上	1包
11才以上15才未満	2/3包
8才以上11才未満	1/2包
5才以上8才未満	1/3包
5才未満	服用しないこと

<用法用量に関する注意>

- (1) この医薬品は定められた用法用量を厳守してください
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください

成分と働き

3包（大人1日量）中

成 分	3包中(1日量)	働 き
リン酸ジヒドロコデイン	30mg	せきをしずめ たんのきれを よくします
dl-塩酸メチルエフェドリン	30mg	
ノスカピン	30mg	
ジプロフィリン	120mg	せきをしずめます
白色濃厚セキサノール	600mg	

添加物として、乳糖、バレイショデンプン、カルメロースNa、黄色4号(タートラジン)を含有する

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください
- (3) 誤用をさけ品質を保持するため他の容器に入れ替えないでください
- (4) 1包を分割した残りを使用する時は、袋の口を折り返して保管し2日以内に使用してください

くすり相談窓口

お問い合わせ先 松井製薬(株)
電話 (076)421-6061
受付時間 午前9時から午後4時まで
(土、日、祝日を除く)



製造販売元 松井製薬株式会社

〒930-0058 富山市古鍛冶町7-7