

この添付文書は本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

漢方製剤

葛根湯エキス〔細粒〕7

本方は、多くの人に知られ、また、「葛根湯医者」などという言葉があるくらいよく用いられる応用の広い処方です。本方の適応症は項背強急し、汗の出ないものを目標とします。



●使用上の注意●



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる) 次の人は服用しないでください。

生後3カ月未満の乳児



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 体の虚弱な人 (体力の衰えている人、体の弱い人)
 - (4) 胃腸の弱い人
 - (5) 発汗傾向の著しい人
 - (6) 高齢者
 - (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
 - (8) 次の症状のある人 むくみ、排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた人 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 1ヵ月位(感冒、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には、5～6回)服用しても症状がよくならない場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください。

●成分・分量● 本品3包(6.0g)は

カッコン	2.6g	シャクヤク	1.3g
マオウ	1.95g	カンゾウ	1.3g
タイソウ	1.95g	ショウキョウ	0.65g
ケイヒ	1.3g		

葛根湯水製エキス3.2gを含有する細粒剤です。添加物としてメタケイ酸アルミン酸Mg、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、乳糖、トウモロコシデンプン、香料を含有します。

●効能・効果●

感冒、鼻かぜ、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

●用法・用量●

次の量を1日3回、食前又は食間に服用してください。(食間とは食後2～3時間を指します。)

年 齢	1回量
大人(15才以上)	1包
15才未満7才以上	2/3包
7才未満4才以上	1/2包
4才未満2才以上	1/3包
2才未満	1/4包

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

●保管及び取扱い上の注意●

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わるため。)
- (4) 本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがあります。効果には変わりありません。
- (5) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。

●お問い合わせ先●

塩釜蛸紅華湯株式会社 薬事学術部

TEL (022)384-5998 受付時間 10:00～17:00(土・日・祝日を除く)

発 売 元

製造販売元



塩釜蛸紅華湯株式会社

仙台市青葉区大手町1番1号



松浦薬業株式会社

名古屋市中区大高町新田36