

かみきひとう 加味帰脾湯エキス[細粒] 9

本方は、「済生方」に記載されている処方で、帰脾というのは体の血があちこちバラバラに散らばった時にそれを脾の方へ帰らせる薬であると書かれております。従って、貧血によって起こる諸症によく用いられます。

⚠️・使用上の注意・



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3)今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

(2)1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

●用法・用量●

次の量を1日3回、食前又は食間に服用してください。

(食間とは食後2～3時間を指します。)

年 齢	1 回 量	
	分包剤	大入り剤
大人(15才以上)	1 包	2.0 g
15才未満7才以上	2/3包	1.3 g
7才未満4才以上	1/2包	1.0 g
4才未満2才以上	1/3包	0.7 g
2才未満	1/4包	0.5 g以下

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

●効能・効果●

虚弱体質で血色の悪い人の次の諸症；
貧血、不眠症、精神不安、神経症

●成分・分量●

本品3包(6.0g)又は6.0gは

ニンジン	1.5g	オンジ	0.75g
ビャクシュツ	1.5g	サイコ	1.5g
ブクリョウ	1.5g	サンシシ	1.0g
サンソウニン	1.5g	カンゾウ	0.5g
リュウガンニク	1.5g	モッコウ	0.5g
オウギ	1.0g	タイソウ	0.75g
トウキ	1.0g	ショウキョウ	0.25g

加味帰脾湯エキス6.8gを含有する細粒剤です。添加物としてメタケイ酸アルミン酸Mg、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、乳糖、デキストリン、トウモロコシデンプン、香料を含有します。

●保管及び取扱い上の注意●

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わるため。)
- (4)本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがあります。効果には変わりありません。
- (5)分包剤で1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。

●お問い合わせ先●

松浦漢方株式会社 薬事学術部

TEL (052)883-5131 受付時間 10:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

発売元

松浦漢方株式会社
名古屋市昭和区円上町24-21

製造販売元

 **松浦漢方株式会社**
名古屋市緑区大高町寅新田36