

漢方製剤

第2類医薬品

かみきひとう 加味帰脾湯エキス〔細粒〕9

本方は、「済生方」に収載されている処方で、帰脾というのは体の血があちこちバラバラに散らばった時にそれを脾の方へ帰らせる薬であると書かれています。従って、貧血によって起こる諸症によく用いられます。

● 使用上の注意 ●



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1)医師の治療を受けている人

(2)妊婦又は妊娠していると思われる人

(3)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

● 効能・効果 ●

体力中等度以下で、心身が疲れ、血色が悪く、ときに熱感を伴うものの次の諸症：

貧血、不眠症、精神不安、神経症

●用法・用量●

次の量を食前又は食間に水又は温湯で服用してください。
(食間とは食後2～3時間を指します。)

年 齢	1 回 量		1日服用回数
	分包剤	大入り剤	
大人(15才以上)	1 包	2.0 g	3 回
15才未満7才以上	2/3包	1.3 g	
7才未満4才以上	1/2包	1.0 g	
4才未満2才以上	1/3包	0.7 g	
2才未満	1/4包	0.5 g 以下	

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

●成分・分量●

本品3包(6.0 g)又は6.0 gは

ニンジン	1.5 g	オンジ	0.75 g
ビャクシュツ	1.5 g	サイコ	1.5 g
ブクリョウ	1.5 g	サンシシ	1.0 g
サンソウニン	1.5 g	カンゾウ	0.5 g
リュウガンニク	1.5 g	モッコウ	0.5 g
オウギ	1.0 g	タイソウ	0.75 g
トウキ	1.0 g	ショウキョウ	0.25 g

上記より製した加味帰脾湯エキス6.8 g(乾燥物換算で約3.4 gに相当)を含有する細粒剤です。添加物としてメタケイ酸アルミン酸Mg、ヒプロメロース、乳糖、デキストリン、トウモロコシデンプン、香料を含有します。

●保管及び取扱い上の注意●

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがあります。効果には変わりありません。
- (5)分包剤で1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

●お問い合わせ先●

松浦漢方株式会社 薬事学術部

TEL (052)883-5131 受付時間 10:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

発 売 元

松浦漢方株式会社
名古屋市昭和区円上町24-21

製造販売元

 **松浦漢方株式会社**
名古屋市緑区大高町寅新田36