

漢方製剤

第2類医薬品

かみへい いさん 加味平胃散エキス[細粒] 67

本方は、平胃散に神麴、麦芽、山楂子を加えたもので、胃がもたれるタイプの人の食欲不振、消化不良などに奏効する胃の薬です。



●使用上の注意●



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください。

生後 3 ヶ月未満の乳児



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 1 ヶ月位（急性胃炎に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくなる場合

* ●効能・効果● *

体力中等度で、胃がもたれて食欲がなく、ときに胸やけがあるものの次の諸症：

急・慢性胃炎、食欲不振、消化不良、胃腸虚弱、腹部膨満感

●用法・用量●

次の量を1日3回、食前又は食間に水又は温湯で服用してください。
(食間とは食後2～3時間を指します。)

年 齢	1 回 量	
	分包剤	大入り剤
大人(15才以上)	1 包	2.0 g
15才未満7才以上	2/3包	1.3 g
7才未満4才以上	1/2包	1.0 g
4才未満2才以上	1/3包	0.7 g
2才未満	1/4包	0.5 g 以下

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

●成分・分量●

本品3包(6.0 g)又は6.0 gは

ソウジュツ	2.0 g	タイソウ	1.0 g
コウボク	1.5 g	シンキク	1.0 g
チンピ	1.5 g	バクガ	1.0 g
カンゾウ	0.5 g	サンザシ	1.0 g
ショウキョウ	0.5 g		

上記より製した加味平胃散水製エキス4.0gを含有する細粒剤です。
添加物としてメタケイ酸アルミン酸Mg、ヒプロメロース、乳糖、
バレイショデンプン、香料を含有します。

●保管及び取扱い上の注意●

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがあります。効果には変わりありません。
- (5)分包剤で1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

●お問い合わせ先●

松浦漢方株式会社 薬事学術部

TEL (052)883-5131 受付時間 10:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

発 売 元

松浦漢方株式会社
名古屋市昭和区円上町24-21

製造販売元

 **松浦漢方株式会社**
名古屋市長区大高町寅新田36