

*2009年4月改訂



服用に際して、この添付文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

きゅう き ちょう けつ いん だい いち か げん
芎帰調血飲第一加減
エキス[細粒]50
(漢方製剤)

■特徴

芎帰調血飲第一加減は、安全で使い易く、日本人の体質に合った処方では知られる一貫堂方で、活血祛瘀剤の代表的なものです。

本方は下剤を配合せず、補剤からなる活血祛瘀剤ですので、産後の体力低下等に用いることができるのが大きな特徴です。

⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと** *

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

次の人は服用しないで下さい。

生後3ヵ月未満の乳児



■ 相談すること

1. 次の人は、服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人
- (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心、食欲不振、胃部不快感

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

* ■ 効能・効果

体力中等度以下のものの次の諸症。ただし産後の場合は体力に関わらず使用できる。

血の道症^{注)}、月経不順、産後の体力低下

注) 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことです。

※裏面もお読み下さい。

*** ■ 用法・用量**

次の量を、1日3回、食前又は食間に服用して下さい。
(食間とは食後2～3時間を指します。)

年 齢	1回の服用量	1日の服用回数
大人(15才以上)	1包	3回
15才未満7才以上	2/3包	
7才未満4才以上	1/2包	
4才未満2才以上	1/3包	
2才未満	1/4包	

●服用に際しての注意

- (1) 定められた用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- (3) 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させて下さい。

■成分・分量

本品3包(6.0g)は

トウキ……………1.0g	ヤクモソウ……0.75g
ジオウ……………1.0g	カンゾウ……………0.5g
ブクリョウ………1.0g	トウニン……………0.75g
ウヤク……………1.0g	コウカ……………0.75g
ボタンビ……………1.0g	キジツ……………0.75g
タイソウ……………0.75g	ケイヒ……………0.75g
ショウキョウ………0.5g	ゴシツ……………0.75g
センキュウ……………1.0g	モッコウ……………0.75g
ビャクジュツ………1.0g	エンゴサク………0.75g
チンピ……………1.0g	シャクヤク………0.75g
コウブシ……………1.0g	

芎帰調血飲第一加減水製エキス6.9gを含有する細粒剤です。添加物としてアスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、メタケイ酸アルミン酸Mg、ヒプロメロース、デキストリン、乳糖、トウモロコシデンプン、香料を含有します。

■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管して下さい。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないで下さい。
- (4) 本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがあります。効果には変わりありません。
- (5) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折返して保管し、2日以内に使用して下さい。
- (6) この文書は、本剤を服用の際に必要な注意事項等が記載されていますので、箱に入れて保管して下さい。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

◎お問合せ先

イスクラ産業株式会社 お客様相談室
〒103-0027 東京都中央区日本橋1-14-2
電 話：03-3281-3363
受付時間：午前9:00から午後5:00まで
(土、日、祝日を除く)

発 売 元 **イスクラ産業株式会社**
東 京 都 中 央 区 日 本 橋 1 - 14 - 2
製造販売元 **松 浦 薬 業 株 式 会 社**
名 古 屋 市 緑 区 大 高 町 寅 新 田 3 6