

この添付文書は本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。



漢方製剤

第2類医薬品

きゅう き ちょう けつ いん だい いち か げん
芎帰調血飲第一加減
エキス〔細粒〕50

本方は、日本人の体質に合うことで知られる一貫堂医学で用いられる活血祛瘀剤の代表的な処方です。

気と血の巡りを改善し、産後や月経などに起因するご婦人特有の気になる症状を良い方向へ導いて行きます。



●使用上の注意●



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3)胃腸が弱く下痢しやすい人
- (4)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

●効能・効果●

体力中等度以下のものの次の諸症。ただし産後の場合は体力に関わらず使用できる。

血の道症、月経不順、産後の体力低下

〔効能・効果に関連する注意〕

血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことです。

（裏面につづく）

●用法・用量●

次の量を食前又は食間に水又は温湯で服用してください。
(食間とは食後2～3時間を指します。)

年 齢	1 回 量		1日服用回数
	分包剤	大入り剤	
大人(15才以上)	1 包	2.0 g	3 回
15才未満7才以上	2/3包	1.3 g	
7才未満4才以上	1/2包	1.0 g	
4才未満2才以上	1/3包	0.7 g	
2才未満	1/4包	0.5 g 以下	

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

●成分・分量●

本品3包(6.0 g)又は6.0 gは

トウキ	1.0 g	ヤクモソウ	0.75 g
ジオウ	1.0 g	カンゾウ	0.5 g
プクリョウ	1.0 g	トウニン	0.75 g
ウヤク	1.0 g	コウカ	0.75 g
ボタンピ	1.0 g	キジツ	0.75 g
タイソウ	0.75 g	ケイヒ	0.75 g
ショウキョウ	0.5 g	ゴシツ	0.75 g
センキュウ	1.0 g	モッコウ	0.75 g
ビャクジュツ	1.0 g	エンゴサク	0.75 g
チンピ	1.0 g	シャクヤク	0.75 g
コウブシ	1.0 g		

上記より製した芎帰調血飲第一加減水製エキス6.9 g(乾燥物換算で約3.45 gに相当)を含有する細粒剤です。添加物としてアスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、メタケイ酸アルミン酸Mg、ヒプロメロース、デキストリン、乳糖、トウモロコシデンプン、香料を含有します。

●保管及び取扱い上の注意●

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがあります。効果には変わりありません。
- (5)分包剤で1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

●お問い合わせ先●

松浦漢方株式会社 薬事学術部

TEL (052)883-5131 受付時間 10:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

発 売 元

松浦漢方株式会社

名古屋市昭和区円上町24-21

製造販売元

松浦薬業株式会社

名古屋市長区大高町寅新田36