

●成分・分量●本品6.0gは
サイコ……2.5g ニンジン……1.0g
ハンゲ……2.0g タイソウ……1.0g
ケイヒ……1.25g カンゾウ……0.75g
シャクヤク……1.0g ショウキョウ……0.33g
オウゴン……1.0g

上記より製した柴胡桂枝湯エキス(「漢方診療医典」、1/2量)3.6g(乾燥物換算で約1.8gに相当)を含有する細粒剤です。添加物としてメタケイ酸アルミン酸Mg、ヒプロメロース、乳糖、トウモロコシデンプン、香料を含有します。

●効能・効果●
体力中等度又はやや虚弱で、多くは腹痛を伴い、ときに微熱・寒気・頭痛・はきけなどのあるものの次の諸症：
胃腸炎、かぜの中期から後期の症状

 ボトル、キャップ
中栓、外装フィルム

500g



●用法・用量●
大人(15才以上) 1回 2.0g
15才未満7才以上 1回 1.3g
7才未満4才以上 1回 1.0g
4才未満2才以上 1回 0.7g
2才未満 1回 0.5g以下

1日3回、食前又は食間に服用してください。
用時添付のサジを使用してください。
(サジ一杯は0.5gです。)

〔用法・用量に関連する注意〕
(1)用法・用量を厳守してください。
(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(3)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

〔副作用被害救済制度〕
☎0120-149-931

製造販売元
 松浦薬業株式会社
名古屋市緑区大高町寅新田36

漢方専門 一心堂薬局

さい こ けい し どう 柴胡桂枝湯エキス 〔細粒〕23

第2類医薬品



発売元
一心堂漢方株式会社

埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1-80アコルト大野1階
TEL 048-648-2014

●使用上の注意●

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください。 生後3ヵ月未満の乳児

相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人
(3)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
その他	頻尿、排尿痛、血尿、残尿感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 3.1ヵ月位(かぜの中期から後期の症状の場合には1週間位)服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

●保管及び取扱い上の注意●

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがありますが、効果には変わりありません。