

この添付文書は本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。



漢 方 製 剤

第2類医薬品

し も つ と う 四 物 湯 エ キ ス [細 粒] 31

本方は、胃腸障害は見られないが、血行不良や貧血の傾向があり、皮膚がカサカサし、つやの悪い人の血の道症、月経不順、産後あるいは流産後の疲労回復、冷え症やしもやけ、しみなどの諸症状に用いられます。

⚠️ • 使用上の注意 •

❌ **してはいけないこと** *

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください。

生後 3 ヶ月未満の乳児



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
- (4) 胃腸の弱い人
- (5) 下痢しやすい人
- (6) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、食欲不振、腹痛

(2) 1 ヶ月位服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

下痢

* • 効能・効果 •

体力虚弱で、冷え症で皮膚が乾燥、色つやの悪い体質で胃腸障害のないものの次の諸症：

月経不順、月経異常、更年期障害、血の道症[※]、冷え症、しもやけ、しみ、貧血、産後あるいは流産後の疲労回復

注) 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことです。

(裏面につづく)

＊●用法・用量●

次の量を1日3回、食前又は食間に水又は温湯で服用してください。
(食間とは食後2～3時間を指します。)

年 齢	1 回 量	
	分包剤	大入り剤
大人(15才以上)	1 包	2.0 g
15才未満7才以上	2/3包	1.3 g
7才未満4才以上	1/2包	1.0 g
4才未満2才以上	1/3包	0.7 g
2才未満	1/4包	0.5 g 以下

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

●成分・分量●

本品3包(6.0 g)又は6.0 gは

トウキ	1.5 g	センキュウ	1.5 g
シャクヤク	1.5 g	シオウ	1.5 g

上記より製した四物湯水製エキス3.8 gを含有する細粒剤です。添加物としてメタケイ酸アルミン酸Mg、ヒプロメロース、乳糖、トウモロコシデンプン、香料を含有します。

●保管及び取扱い上の注意●

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがありますが、効果には変わりありません。
- (5)分包剤で1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

●お問い合わせ先●

松浦漢方株式会社 薬事学術部

TEL (052)883-5131 受付時間 10:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

発 売 元

松浦漢方株式会社
名古屋市昭和区円上町24-21

製造販売元

 **松浦漢方株式会社**
名古屋市緑区大高町寅新田36