

漢方製剤

第2類医薬品

参蘇飲エキス[細粒]97

本方の適応する感冒は、熱があり頭痛がして、咳や痰や鼻水が出て、嘔吐などを伴うタイプです。また、一般に胃弱で他のかぜ薬を服用と胃がつかえるような人に奏効します。

⚠️・使用上の注意・



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3)今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2)1週間位服用しても症状がよくなる場合

●用法・用量●

次の量を1日3回、食前又は食間に温湯又は水で服用してください。(食間とは食後2〜3時間を指します。)

年 齢	1 回 量	
	分包剤	大入り剤
大人(15才以上)	1 包	2.0 g
15才未満7才以上	2/3包	1.3 g
7才未満4才以上	1/2包	1.0 g
4才未満2才以上	1/3包	0.7 g
2才未満	1/4包	0.5 g 以下

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

(裏面につづく)

* ● 効能・効果 ●

体力虚弱で、胃腸が弱いものの次の諸症：
感冒、せき

● 成分・分量 ●

本品3包(6.0g)又は6.0gは

ソヨウ	0.5g	ブクリョウ	1.5g
キジツ	0.5g	ニンジン	0.75g
キキョウ	1.0g	タイソウ	0.75g
チンピ	1.0g	ショウキョウ	0.25g
カッコン	1.0g	モッコウ	0.5g
ゼンコ	1.0g	カンゾウ	0.5g
ハンゲ	1.5g		

上記より製した参蘇飲水製エキス4.6gを含有する細粒剤です。添加物としてメタケイ酸アルミン酸Mg、ヒプロメロース、乳糖、トウモロコシデンプン、香料を含有します。

● 保管及び取扱い上の注意 ●

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがあります。効果には変わりありません。
- (5)分包剤で1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

● お問い合わせ先 ●

松浦漢方株式会社 薬事学術部

TEL (052)883-5131 受付時間 10:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

発 売 元

松浦漢方株式会社

名古屋市昭和区円上町24-21

製造販売元

 **松浦漢方株式会社**

名古屋市緑区大高町寅新田36