

この添付文書は本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

漢方製剤

第2類医薬品

ばくもんどうとう

# 麦門冬湯エキス[細粒] 54

本方は、下から突き上げてくるようなたんの切れにくい咳、のどのカサカサするような状態に効を奏します。これは処方中の麦門冬や粳米の滋潤作用によるもので、のどに湿りを与えて咳を止めます。

## ⚠️・使用上の注意・



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

**次の人は服用しないでください。**

生後3ヵ月未満の乳児



### 相談すること

**1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。**

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3)水様性の痰の多い人
- (4)高齢者
- (5)次の症状のある人      むくみ
- (6)次の診断を受けた人      高血圧、心臓病、腎臓病

**2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。**

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状        |
|------|------------|
| 消化器  | 食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称     | 症 状                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 間質性肺炎     | せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。                           |
| 偽アルドステロン症 | 尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。 |
| 肝機能障害     | 全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。                      |

(2)1ヵ月位（からぜきに服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合

**3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください。**

## ＊●効能・効果●

体力中等度以下で、たんが切れにくく、ときに強くせきこみ、又は咽頭の乾燥感があるものの次の諸症：

からぜき、気管支炎、気管支ぜんそく、咽頭炎、しわがれ声

## ●用法・用量●

次の量を1日3回、食前又は食間に服用してください。

(食間とは食後2～3時間を指します。)

| 年 齢       | 1 回 量 |         |
|-----------|-------|---------|
|           | 分包剤   | 大入り剤    |
| 大人(15才以上) | 1 包   | 2.0 g   |
| 15才未満7才以上 | 2/3包  | 1.3 g   |
| 7才未満4才以上  | 1/2包  | 1.0 g   |
| 4才未満2才以上  | 1/3包  | 0.7 g   |
| 2才未満      | 1/4包  | 0.5 g以下 |

### 〔用法・用量に関連する注意〕

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

## ●成分・分量●

本品3包(6.0 g)又は6.0 gは

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| バクモンドウ ……………5.0 g | タイソウ ……………1.5 g |
| ハンゲ ……………2.5 g    | ニンジン ……………1.0 g |
| コウベイ ……………2.5 g   | カンゾウ ……………1.0 g |

上記より製した麦門冬湯エキス4.0 gを含有する細粒剤です。添加物としてメタケイ酸アルミン酸Mg、ヒプロメロース、乳糖、バレイショデンプン、香料を含有します。

## ●保管及び取扱い上の注意●

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なる場合がありますが、効果には変わりありません。
- (5)分包剤で1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

## ●お問い合わせ先●

松浦漢方株式会社 薬事学術部

TEL (052)883-5131 受付時間 10:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

発 売 元

**松浦漢方株式会社**

名古屋市昭和区円上町24-21

製造販売元

 **松浦薬業株式会社**

名古屋市長区大高町寅新田36