

この添付文書は本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

第2類医薬品

## 漢方製剤

# 中薬 杞菊地黄丸

中薬杞菊地黄丸は、「口が渇いて疲れやすい」、「顔と手足だけがほてる」、「尿が出にくい」、「頻尿」などの年齢と共に現れる症状のある方の「目の疲れ」や「かすみで見えにくい」といった目の症状の回復を促します。

- 生薬粉末を生かしたお薬です。
- お薬の味が広がらない飲みやすい大きさの丸剤です。

### ●使用上の注意●



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人
  - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### \*■効能・効果

体力中等度以下で、疲れやすく胃腸障害がなく、尿量減少又は多尿で、ときに手足のほてりや口渇があるものの次の諸症：かすみ目、つかれ目、のぼせ、頭重、めまい、排尿困難、頻尿、むくみ、視力低下

## ■用法・用量

次の量を食前又は食間に服用してください。  
(食間とは、食後2～3時間を指します。)

年齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	8丸	3回
15才未満	服用しないでください	

### 〔用法・用量に関連する注意〕

用法・用量を厳守してください。

## ■成分・分量 本品24丸中

クコシ(枸杞子) ……………300mg	サンヤク(山薬) ……………600mg
キクカ(菊花) ……………300mg	ブクリョウ(茯苓) ……450mg
ジオウ(地黄) ……………1200mg	ポタンピ(牡丹皮) ……450mg
サンシュユ(山茱萸) ……600mg	タクシャ(沢瀉) ……………450mg

を含有する丸剤です。添加物として、安息香酸Na、ハチミツ、タルク、トウモロコシデンプン、サラシミツロウを含有します。

## ■保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)本剤は、時により丸剤と丸剤が付着して塊状となることがありますので、ご使用の時、ピンを軽く振るか、スプーンなどでほぐしてから用いてください。なお、薬効には変わりありませんので、安心して服用してください。
- (5)ピンの中のとめ物は、輸送中に丸剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

## ■お問い合わせ先

発売元 薬日本堂株式会社

TEL 03(3446)2011(代) 受付時間10:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

発売元  
**薬日本堂株式会社**  
東京都品川区北品川4-7-35

製造販売元  
 **松浦薬業株式会社**  
名古屋市緑区大高町寅新田36